

Contenu

Rouge queue noir (<i>Phoenicurus ochurus</i>)	3
Rouge queue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>).....	7
Rouge gorge (<i>Erithacus rubecula</i>).....	11
Rossignol philomèle (<i>Lusciama megarhynchos</i>).....	15
Ascenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	16
George bleu à miroir (<i>Lusciana svecica</i>).....	19
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>).....	23
Bergeronnette des roseaux (<i>Motacilla cinerea</i>).....	25
Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	28
Accenteur alpin (<i>Prunella collaris</i>).....	31
Rossignol progné (<i>Lusciana lusciana</i>)	34
Calliope sibérienne (<i>Lusciana calliope</i>)	36
Tarier pâtre (<i>saxicola torquata</i>) mâle	38
Tarier pâtre (<i>saxicola torquata</i>) femelle	40
Tarier des prés (<i>saxicola rubetra</i>)	42
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)	44
Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>)	47
Fauvette grisette (<i>Sylvis communis</i>).....	49
Sittelle torchepot (<i>Sitta europea</i>).....	51
Merle bleu (<i>Monticola solitarius</i>).....	55
Moineau cisalpin (<i>Passer italiae</i>).....	57
Martin roselin (<i>Sturnus roseus</i>).....	59
Merle à plastron (<i>Turdus torquatus alpestris</i>)	61
Merle de roche (<i>Monticola saxatilis</i>)	63

Rouge queue noir (Phoenicurus ochurus
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14cm. Forme élancée et élégante. Tête bien proportionnée au corps. Pattes longues

Zones du plumage	Couleur
Tête	Mâle : <ul style="list-style-type: none"> • Dessus du crane gris anthracite jusqu'à la hauteur de l'œil • Fine bande frontale, joues et menton noir se prolongeant sur la gorge
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"> • Nuque gris anthracite • Côtés du cou noir
Dos	Gris noir plus foncé que le crâne
Poitrine, gorge	<ul style="list-style-type: none"> • Noir lustré • La zone inférieure du poitrail se dégrade en gris foncé vers le ventre
Flancs	Gris foncé uniforme
Ventre, région anale	Ventre gris foncé, se fondant en brun rouille sur la partie anale
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Couvertures noires légèrement liserés de gris • Rémiges gris foncé, portant une zone claire à la partie médiane, en forme de miroir alaire
Croupion	Roux
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Rectrices externes rousses • Rectrices internes rousses à la base devenant noirâtre
Bec	Noir assez long, fin et pointu
Yeux	Noir
Pattes, doigts	<ul style="list-style-type: none"> • Noir • Tarse long

Ongles

noirs

*Remarques : la femelle présente une livrée gris brun unie, un peu plus foncée sur la partie dorsale. L'œil est entouré d'un cercle clair, très fin. la couleur de la queue est identique à celle du mâle.
En première année les mâles peuvent présenter un plumage intermédiaire entre mâle et femelle.*





Rouge queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14cm. Forme élancée et élégante. Tête bien proportionnée au corps. Pattes longues

Zones du plumage	Couleur
Tête	Mâle : <ul style="list-style-type: none"> • Fine bande frontale noire, nettement délimitée d'une bande blanche plus large qui se prolonge au-dessus de l'œil. • Sommet et partie arrière du crâne gris souris. • Masque noir couvrant les joues, le menton et la gorge
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"> • Nuque et partie dorsale du cou gris souris • Côtés du cou noir comme les joues et la gorge
Dos	Gris souris
Poitrine, gorge	Gorge noire en prolongement du dessin facial, nettement délimité du poitrail roux lumineux
Flancs	Toute la partie poitrail et flancs sont de couleur rousse uniforme et lumineuse
Ventre, région anale	Ventre blanc, se dégradant en roux vers la région anale
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Petites couvertures gris foncé • Grandes couvertures noires finement bordées de gris • Rémiges noires avec un liseré gris brun
Croupion	Roux
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Rectrices externes rousse • Rectrices centrales rousses à la base, devenant noirâtres jusqu'à leurs extrémités
Bec	Noir. Assez long. Fin et pointu
Yeux	Noir

Pattes, doigts	Noirâtre. Tarse long
Ongles	noir

Remarques : la femelle est de couleur gris brun sur la tête et la partie dorsale. Les rémiges sont brun noirâtre avec une bordure gris brun. Croupion et queue comme le mâle. Gorge gris brun. Poitrail et flancs gris beige incrusté de chamois. Ventre blanchâtre. Zone anale rousse. En première année les mâles peuvent présenter un plumage intermédiaire entre mâle et femelle.



Standard K.B.O.F.



Rafael de Rojas

Rouge gorge (Erithacus rubecula)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14cm. Forme arrondie assez trapue. Haut sur pattes

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"> • Calotte crânienne brune • Front et face roux orangé lumineux • Arrière de la joue gris
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"> • Cou épais • Nuque brune
Dos	Brun uniforme
Poitrine, gorge	Roux orangé comme la face
Flancs	<ul style="list-style-type: none"> • Haut des flancs gris bleu en forme de bandes remontant jusqu'à l'arrière de la joue • Bas des flancs chamois clair
Ventre, région anale	Blanc sale
Ailes	Couvertures et rémiges brunes uniforme comme le dos
Croupion	Brun
Queue	Rectrices brunes
Bec	Noirâtre. Assez long. Pointu
Yeux	Noirs. Assez grands, enchâssé au centre de la tête
Pattes, doigts	Brun
Ongles	brun

Remarques : pas de dimorphisme sexuel apparent.



Standard K.B.O.F.





Rossignol philomèle (Lusciama megarymchos)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 17cm. forme élégante. Assez rebondi. Tête ovale. Encolure peu marquée. Assez haut sur pattes

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"> • Assez fine, plus arrondie à la nuque • Crane et joues brun roux • Peut porter un léger sourcil gris
Cou, nuque	Brun assez soutenu
Dos	Brun uniforme
Poitrine, gorge	<ul style="list-style-type: none"> • Dessous du bec blanchâtre • Poitrail beige clair uniforme
Flancs	Beige clair
Ventre, région anale	Blanchâtre
Ailes	Brunes, plus foncées sur leur partie centrale
Croupion	Brun roux soutenu
Queue	Brun roux soutenu
Bec	Gris. Fin et pointu
Yeux	Noirs. Assez grands. Léger cercle oculaire
Pattes, doigts	Couleur chair
Ongles	Couleur chair

Remarques : pas de dimorphisme sexuel. Peut être confondu avec le rossignol progné

Ascenteur mouchet (Prunella modularis)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"> • Dessin brun finement strié • Zone loreale et joues brun légèrement strié • Sourcil gris bleuté qui se prolonge sur le côtés du cou en contournant la joue et s'étale sur le menton et la gorge
Cou, nuque	<ul style="list-style-type: none"> • Nuque brune légèrement striée • Cotés du cou gris bleuté
Dos	Brun marqué de larges stries brun noir
Poitrine, gorge	Gris bleuté uniforme, qui se dégrade e gris beiges crémeux vers le ventre
Flancs	Brun roux strié de gris noirâtre
Ventre, région anale	Gris beige crémeux, strié de noir en zone anale
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Couvertures brun foncé avec liseré clair en partie inférieure, dessinant une double barre alaire peu distincte • Grandes rémiges brun roux, plus foncé à l'extrémité • Rémiges secondaires brun noirâtre, légèrement bordées de blanc
Croupion	Gris brun
Queue	Rectrices brun noirâtre
Bec	Gris noirâtre
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Brun rougeâtre
Ongles	brun

Remarques : *silhouette fine et élégante. Pas de dimorphisme sexuel important.*





George bleu à miroir (Lusciana svecica)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14cm. Forme du corps ronde, voisine de celle du rouge-gorge. Haut sur patte. Se tient souvent queue dressée et ailes tombantes

Zones du plumage	Couleur
Tête	Mâle : <ul style="list-style-type: none"> • Dessus du crane gris brun • Zone lorale et joue sgrisw brun très légèrement écaillé • Trait sourcilier blanchâtre • Menton et gorge bleu lustré
Cou, nuque	Gris brun un peu plus clair que la tête
Dos	Gris brun
Poitrine, gorge	Mâle : <ul style="list-style-type: none"> • Dessin en forme de bavette bleu intense, lumiuneux à reflet satinéjusqu'en haut du poitrail et èportant en son centre une ocelle de forme ovale, blanche (ssp <i>L.s.svecica</i>), centre rouge (ssp. <i>L. s.cynecula</i>). • Le bas de la bavette est borndé de noir, puis soulignée d'une bande rousse.
Flancs	Beige rosâtre à la partie inférieure
Ventre, région anale	Partie inférieur du poitrail, zone ventrale et anale blanc grisâtre
Ailes	Gris brun comme le dos. Partie centrale des rémige plus foncé
Croupion	Gris brun

Queue	Partie inférieure des rectrices rousse (très visible en vol) se dégradant en brun noirâtre à l'extrémité
Bec	Gris noirâtre
Yeux	Noirs. Assez grand
Pattes, doigts	Brun noirâtre
Ongles	Brun noirâtre

Remarques : la femelle porte à la gorge une bavette blanchâtre délimitée de brun noir (parfois teintée de bleu à l'état adulte) le reste de la livrée est gris brun, plus clair sur le ventre.







Bergeronnette grise (Motacilla alba)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 18 cm. Forme élégante et élancée. Assez haute sur pattes. Balance verticalement la queue.

Zones du plumage	Couleur
Tête Cou, gorge, nuque	<p>Plumage nuptiale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • De forme elliptique, avec l'arrondi du crane élégant. • Zone frontale et joues blanche jusqu'au-dessus de l'œil. • Dessus du crâne et nuque noir. • Plastron noir, couvrant le menton, la gorge et le haut du poitrail ou il se divise en arrondi <p>Plumage hivernal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La bavette se réduit à un demi-collier noir en forme de croissant • Le menton et la gorge sont blancs • Le noir du crâne devient gris foncé
Dos	Gris uniforme
Poitrine,	blanc
Flancs	Blanc, voilé de gris
Ventre, région anale	Blanc
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Épaule grise • Petites couvertures noires à bordure grise • Grande couvertures grises à bordure blanche • Grandes rémiges gris noir • Rémiges secondaires noires bordées de blanc
Croupion	Gris
Queue	<ul style="list-style-type: none"> • Rectrices externes blanches • Rectrices centrales noires
Bec	Gris noirâtre. Assez long, fin et pointu

Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris noirs
Ongles	noirs

Remarques : la femelle présente des couleurs plus ternes et un dessin réduit.



Bergeronnette des ruisseaux (Moticilla cinerea)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 18cm. Forme élégante et svelte. Haute sur pattes. Longue queue balancée verticalement.

Zones du plumage	Couleur
Tête	<ul style="list-style-type: none"> • De forme elliptique bien proportionnée au corps. • Dessus du crâne et nuque gris • Joues grises rejoignant la nuque • Zone loreale grise. • Trait sourcilier blanc • Trait moustachal blanc servant de délimitation entre la joue et la bavette <p>en plumage nuptial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bavette noire couvrant le menton et la gorge. <p>En hiver</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le noir de la bavette est remplacé par une couleur blanche qui peu être légèrement moucheté de noir
Cou, nuque	Gris
Dos	Gris uniforme
Poitrine, gorge	Jaune citron, couvrant toute la face ventral
Flancs	Jaune, parfois légèrement teinté de gris verdâtre à hauteur de l'épaule
Ventre, région anale	Jaune citron
Ailes	<p>Gris foncé voilé de brun</p> <p>Extrémité des grandes couvertures internes frangée de blanc</p> <p>Grandes rémiges gris noir, les secondaires étant bordées de blanc</p>
Croupion	Jaune verdâtre
Queue	Longue

	Rectrices externes blanches Rectrices internes gris noirâtre
Bec	Gris noirâtre. assez long, pointu
Yeux	Noirs. Léger cercle oculaire blanc
Pattes, doigts	Couleur chair. Pattes longues et fines
Ongles	Couleur chair

Remarques : la femelle est dépourvue de bavette noire et présente un menton et une gorge blanchâtre. L'ensemble des couleurs est un peu plus pâle que chez le mâle.



Bergeronnette printanière (Moticilla flava)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 17cm. Forme élancé et élégante. Haute sur pattes

Zones du plumage	Couleur
Tête	<p>Fine, crane assez plat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Front, dessus de la tête et nuque , gris clair • Trait sourcilier, blanc • Dessin de la joue, gris foncé • Menton et gorge jaune, comme la face ventrale. Blanchâtre en hiver <p>Il existe plusieurs sous espèces dont la couleur de tête diffère.</p>
Cou, nuque	Gris clair
Dos	Gris beige verdâtre
Poitrine, gorge, Flancs Ventre, région anale	Jaune citron, plus pâle en hiver
Ailes	<ul style="list-style-type: none"> • Couvertures gris foncé, bordée de blanc • Rémiges gris brun foncé, avec bordure blanchâtre
Croupion	Gris verdâtre
Queue	<p>Assez longue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rectrices externes blanches • Rectrices internes, gris brun foncé
Bec	Gris
Yeux	Noirs. Léger cercle oculaire
Pattes, doigts	Gris

Ongles

Gris

Remarques : *la femelle est plus pâle que le mâle*



Accenteur alpin (Prunella colleris)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 18cm. Forme robuste. Tête ronde sans encolure marquée

Zones du plumage	Couleur
Tête	Ronde Crâne et joues gris bleuré Menton et gorge marqués d'une bavette blanchâtre finement écaillée de noir
Cou, nuque	Encolure et cou peu marqués Nuque gris bleuté comme le crâne
Dos	Gris brun, marqué de larges stries brun noirâtre
Poitrine, gorge	Bavette blanchâtre écaillée de noir, couvrant toute la gorge Poitrail gris
Flancs	Fortement marqué de stries brunes sur fond gris brun
Ventre, région anale	Gris comme le poitrail, s'éclaircissant sur le bas ventre Zone sous caudale blanchâtre striée de brun noir
Ailes	Scapulaires et couvertures gris noirâtre, dont l'extrémité blanche forme une double barre alaire. Grandes rémiges gris brun plus clair sur le vexille externe Rémiges secondaires brun noir avec liseré brun clair virant au blanc à l'extrémité
Croupion	Gris brun, strié de noir
Queue	Rectrices brun foncé, noirâtre dans l'axe central

Bec	Fin, pointu. Gris noir marqué de jaune près des commissures.
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Brun grisâtre
Ongles	Brun grisatre

Remarques : pas de dimorphisme sexuel important





Rossignol progré (Lusciana lusciana)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 17cm. Forme élégante. Tête ovale à encolure faiblement marquée. Assez haut sur pattes

Zones du plumage	Couleur
Tête	Assez fine. plus arrondi sur la nuque. Crane brun clair, joues brun grisâtre. Dessus du bec crème grisâtre
Cou, nuque	Brun clair comme le crane
Dos	Brun clair uniforme
Poitrine, gorge	Gris beige, très légèrement écaillé de gris foncé
Flancs	Gris beige très légèrement écaillé
Ventre, région anale	Blanchâtre, un peu plus foncé à la zone anale
Ailes	Brunes, rémiges légèrement plus clair sur le pourtour. Rémige secondaires un peu plus brunes Les grandes rémiges sont assez longues
Croupion	Brun roux
Queue	Brun roux comme le croupion
Bec	Gris. Fin et pointu
Yeux	Noirs. Assez grands. Enchassés assez haut sur le crane. Léger cercle oculaire
Pattes, doigts	Couleur chair
Ongles	Couleur chair

Remarques : *pas de dimorphisme sexuel. Peu être confondu avec le rossignol Philomèle*

Calliope sibérienne (Lusciana calliope)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 15cm. Forme fuselée et élancée. Assez haut sur pattes

Zones du plumage	Couleur
Tête	Ovale de forme élégante. Mâle : Crane brun clair. Sourcil blanc. large trait moustache blanc souligné de noir Zone loreale et joues gris noir Dessous du bec rouge carmin lumineux.
Cou, nuque	Brun clair comme la tête
Dos	Brun clair comme la tête
Poitrine, gorge	Chez le mâle, la gorge porte une bavette rouge carmin lumineuses, qui peut être très légèrement délimitée de noir Zone gris beige sur le haut du poitrail, se dégradant en beige
Flancs	Beige
Ventre, région anale	Blanc crémeux du bas du poitrail à la zone anale
Ailes	Épaule et rémiges brunes
Croupion	Brun foncé
Queue	Brun foncé
Bec	Assez long et fin. Gris noirâtre
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris brun
Ongles	Gris brun

Remarques : *la femelle porte une livrée brune assez uniforme, avec sourcils et trait moustaches atténués.
Bavette et zone ventrale blanc crèmeux*

Tarier pâtre (saxicola torquata) mâle
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 12cm.

Zones du plumage	Couleur
Tête	Ronde. Robuste par rapport au corps La tête est entièrement noire de couleur uniforme qui se prolonge sur la nuque, les joues et la gorge.
Cou, nuque	Partie dorsale de la nuque noir qui rejoint le doscôtés du cou blanc pur, de la base de la joue à l'épaule.
Dos	Gris noir, marqué de stries noires
Poitrine, gorge	Gorge noire nettement délimitée du poitrail. Poitrail roux lumineux se dégradant en blanc en partie inférieure.
Flancs	Roux comme le poitrail
Ventre, région anale	Blanchâtre
Ailes	Épaule et couvertures carpiennes noires. Grandes couvertures blanche en forme de barre claire. Rémiges noires finement liserées de gris foncé
Croupion	Blanc marqué de noir
Queue	Noire
Bec	Noir. Fin et pointu
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris brun foncé
Ongles	Gris brun foncé

Remarques : *forme générale trapue, mais harmonieuse*

Tarier pâtre (saxicola torquata) femelle
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 12cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Assez massive. Même capuchon que le mâle, de couleur gris brun avec des stries plus foncées
Cou, nuque	Nuque gris brun. demi collier blanchâtre sur les côtés du cou
Dos	Gris brun portant des stries foncées larges et régulières
Poitrine, gorge	Gorge brun noirâtre nettement délimitée. Poitrail gris beige se dégradant en blanc pâle
Flancs	Gris beige
Ventre, région anale	Blanchâtre
Ailes	Épaule et couvertures carpiennes brun noirâtre à liseré plus clair. Grandes couvertures blanchâtre en forme de barre claire
Croupion	Gris beige strié de brun foncé
Queue	Brun noirâtre
Bec	Gris brun foncé
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris brun foncé
Ongles	Gris brun foncé

Remarques : le 1^{er} hiver, les femelles sont de couleur plus claire, brun noirâtre.

Tarier des prés (saxicola rubetra)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 12,5cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<p>Mâle :</p> <p>Dessous de la tête gris beige fortement strié de noir.</p> <p>Sourcil blanc partant de la base du bec et s'élargissant vers l'arrière de l'œil.</p> <p>Zone loreale et joues brun noirâtre, un peu plus clair au centre. la joue est surlignée d'un trait blanc qui la contourne jusqu'à la nuque</p>
Cou, nuque	Gris brun strié de noir
Dos	Gris brun strié de noir
Poitrine, gorge	Dessous du bec, gorge et poitrail chamois orangé se dégradant en blanc
Flancs	Chamois orangé s'estompant vers le bas
Ventre, région anale	Blanc crémeux
Ailes	<p>Couvertures brun noir à liseré clair.</p> <p>Une partie des couvertures et portent une tache blanche.</p> <p>Rémiges brun noir foncés à leurs extrémités et comportant un liseré gris beige</p>
Croupion	Gris brun strié de noir
Queue	Rectrices brun noirâtre
Bec	Gris noir. Fin et pointu
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris noir

Ongles	Gris noir
--------	-----------

Remarques : la femelle présente le même patron avec des couleurs très atténuées, principalement sur le poitrail.

En plumage hivernale, les mâles sont de couleur moins vives.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Mâle : Calotte noire de la base du bec à l'arrière du cranesans empiété sur l'œil. Zone loreale entre le bec et l'œil et joues gris clair. Dessous du bec gris blanchâtre virant en gris sur le poitrail
Cou, nuque	Gris légèrement voilé de beige
Dos	Gris légèrement voilé de beige
Poitrine, gorge	Gris clair
Flancs	Gris clair
Ventre, région anale	Blanc sale
Ailes	Couvertures et rémiges gris beige, plus foncé à l'extrémité et liseré plus clair
Croupion	Gris
Queue	Gris beige comme les rémiges
Bec	Noir. Fin et pointu
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris noir
Ongles	Gris noir

Remarques : la femelle porte la même livrée que le mâle, mais de couleur plus terne et une calotte brun roux





Fauvette des jardins (Sylvia borin)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 14cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Dessus de la tête et joues gris brun. Sourcils assez indistinct. Menton et haut de la gorge gris beige clair
Cou, nuque	Gris brun
Dos	Gris brun uniforme
Poitrine, gorge	Gris beige uniforme plus foncé que le bec
Flancs	Gris beige comme le haut du poitrail
Ventre, région anale	Blanc sale
Ailes	Zone de l'épaule gris brun uniforme. Rémiges gris brun, plus foncées au centre et à l'extrémité
Croupion	Gris brun uni
Queue	Rectrices de couleur identique aux rémiges
Bec	Fin. Assez long et pointu. Gris, plus foncé à la pointe
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris brun
Ongles	Gris brun

Remarques : *pas de dimorphisme sexuel.*



Fauvette grisette (Sylvia communis)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 14cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Mâle : Casque gris souris couvrant le crane jusqu'à la nuque et l'arrière de la joue. Menton et haut de la gorge blanc
Cou, nuque	Gris souris jusqu'au bas de la nuque
Dos	Gris beige uniforme
Poitrine, gorge	Menton et gorge de couleur blanche, bien délimité au poitrail Poitrail beige rosé
Flancs	Beige rosé comme le poitrail
Ventre, région anale	Blanc
Ailes	Épaules du même gris beige que le dos. Couvertures beige noirâtre, marquées de brun noir au centre. Grandes rémiges gris brun, plus foncé à l'extrémité. Rémiges secondaires beige roussâtre, comme les couvertures.
Croupion	Gris beige comme le dos
Queue	Rectrices externe blanches. Rectrices centrales gris brun foncé.
Bec	Ffin, pointu. Gris, foncé à la pointe
Yeux	Noirs. Entourés d'un cercle oculaire gris blanchâtre
Pattes, doigts	Gris beige clair

Ongles	gris
--------	------

Remarques : la femelle porte la même livrée, avec des couleurs plus ternes. Le poitrail et les flancs sont gris beiges.



Sittelle torchepot (Sitta europea)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14cm. Corps rond et trapu. Tête massive et plate, sans encolure. Queue et pattes courtes

Zones du plumage	Couleur
Tête	Très plate, enchassée directement dans les épaule. Crane entièrement gris bleuté. Trait loreal noir partant de la commissure et s'étirant à hauteur de l'œil jusqu'à l'encolure. Joues et menton blanchâtre
Cou, nuque	Cou très peu marqué. Nuque gris bleuté
Dos	Gris bleuté
Poitrine, gorge	Gorge blanchâtre se dégradant en chamois clair sur le poitrail.
Flancs	De couleur rousse plus vive en partie inférieure
Ventre, région anale	Chamois clair
Ailes	Couvertures gris bleuté uni. Rémiges de même couleur gris noir au centre. Grandes rémiges gris noirâtre.
Croupion	Gris bleu
Queue	Très courte. Gris bleu
Bec	Noir à la pointe, plus clair aux commissures Robuste, long et pointu
Yeux	Noirs
Pattes, doigts	Gris brun

Ongles

Gris brun

Remarques : pas de dimorphisme sexuel apparent







Merle bleu (Monticola solitarius)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 20cm. Oiseau élégant et bien équilibré

Zones du plumage	Couleur
Tête	Bien dégagée du corps, assez plate, en gris-ardoise très nettement bleuté. Trait loreal : sombre. Cercle oculaire : clair.
Cou, nuque	Gris-ardoise bleuté.
Dos	Gris-ardoise bleuté, légèrement ombré.
Poitrine, gorge	Gris-ardoise bleuté
Flancs	Gris-ardoise bleuté.
Ventre, région anale	Gris-noirâtre, avec reflet bleu
Ailes	Rémiges et couvertures : noirâtres, portant un liseré gris-bleuté.
Croupion	Gris-ardoise bleuté.
Queue	De longueur moyenne Rectrices : noirâtres, finement liserées de gris-bleuté.
Bec	Gris-noir, long, pointu mais robuste.
Yeux	Noir, assez grands
Pattes, doigts	Gris-noirâtre, assez longues
Ongles	Noir mat

Remarques : *La femelle porte une livrée brun-ocre soutenu avec un écaillage noirâtre sur la tête, le dos et la face ventrale où il est plus visible*

Moineau cisalpin (Passer italiae)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14.5cm. Robuste et élégante

Zones du plumage	Couleur
Tête	Robuste, crâne assez plat Zone lorale noire, surmontée d'un fin sourcil blanc Front, calotte crânienne et nuque : entièrement brun roux. Joues : blanchâtres.
Cou, nuque	
Dos	Brun, fortement strié de noir
Poitrine, gorge	Poitrine : Partie supérieure noire s'estompant vers le bas, la base de la poitrine est gris blanchâtre Gorge : Large bavette noire couvrant toute la gorge, la bavette est moins intense en hiver
Flancs	Gris blanchâtre.
Ventre, région anale	Gris blanchâtre.
Ailes	Rémiges primaires : brun noir, liserées de roussâtre sur le vexelle externe. Rémiges secondaires : plus rousses. Couvertures primaires : brun noir avec large liseré roussâtre. Couvertures secondaires : noirâtres, très largement bordées de blanc qui forme une nette bande alaire. Epaules : roussâtre.
Croupion	Gris beige.
Queue	Rectrices brun noir, liserées de brun grisâtre
Bec	Brun noirâtre, plus foncé en été

	Conique et robuste.
Yeux	noirs
Pattes, doigts	Gris brun
Ongles	De couleur foncée.

Remarques : *La femelle est semblable à celle du moineau domestique.*

Martin roselin (Sturnus roseus)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 21cm.

Zones du plumage	Couleur
Tête	Noir avec des reflets vert et pourpre. Les plumes du sommet de la tête sont longues et étroites et peuvent se relever en huppe
Cou, nuque	
Dos	De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison. Cette couleur se perd en captivité
Poitrine, gorge	Gorge : Noir avec des reflets vert et pourpre. De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison. Cette couleur se perd en captivité
Flancs	De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison. Cette couleur se perd en captivité
Ventre, région anale	
Ailes	Rémiges primaires : brunes, bordées à l'extérieur de noir violet Rémiges secondaires : sont noir vert du côté externe et brune du côté interne avec les trois dernières rémiges près du corps noir vert sur les deux côtés. Les couvertures : noires avec des reflets verts et pourpres.
Croupion	De couleur rose plus pâle ou plus vive selon l'âge et la saison
Queue	De couleur noire avec des reflets verts et violets
Bec	Noir et plombé de la base au milieu et de couleur chair ou rose du milieu à la pointe.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	De couleur chair plus ou moins foncée
Ongles	De couleur noirâtre

Remarques : *La femelle ne diffère du mâle que par des couleurs moins brillantes et moins vive, une taille moins forte et une huppe plus courte*

Merle à plastron (Turdus torquatus alpestris)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 24cm. Harmonieuse, svelte

Zones du plumage	Couleur
Tête	Fine et élégante, bien dégagée du corps en noir mat.
Cou, nuque	Assez long en noir mat.
Dos	Noir mat. Les plumes sont ourlées d'une fine bordure grisâtre bien nette
Poitrine, gorge	Poitrine : Le haut de la poitrine porte une marque blanche nette, horizontale, en forme de croissant, formant un demi collier d'une épaule à l'autre. Partie basse du poitrail : noir mat, indistinctement écaillé de grisâtre Gorge : Noir mat.
Flancs	Noir mat, portant un écaillage grisâtre bien contrasté et régulier
Ventre, région anale	Noir mat, écaillé, s'unissant sur la zone anale.
Ailes	Rémiges : noires, liserées de gris-blanchâtre sur les deux tiers inférieur de leur longueur, ce qui détermine une zone claire sur la partie médiane de l'aile Couvertures : noires, bordées de gris-blanchâtre Les ailes sont longues et fines
Croupion	Noir mat.
Queue	Rectrices : noir mat. La queue est assez longue.
Bec	Long, pointu et robuste Jaune à la base, passant au noir à la pointe
Yeux	Noir, assez grands. Cercle oculaire : très peu marqué.
Pattes, doigts	Assez longues, robustes et noires.

Ongles	Noir
--------	------

Remarques : Le noir est remplacé par un brun sombre. Le dessin du poitrail est crème-grisâtre. L'écaillage est plus nettement marqué sur le dos et les flancs. La gorge est crème-grisâtre mouchetée de brun sombre

Merle de roche (Monticola saxatilis
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 19cm. Oiseau élégant et proportionné. Position dressée.

Zones du plumage	Couleur
Tête	Bien dégagée du corps, légèrement plate d'une couleur grise-brune tachetée en noire et blanche avec un léger voile bleuâtre que couvre la tête
Cou, nuque	D'une couleur pareille à la tête mais plus blanchâtre du côté antérieur (gorge).
Dos	Gris-brun tachetée en noir et blanc
Poitrine, gorge	Orangée et avec un dessin écaillé en noir et blanc.
Flancs	Semblable à la poitrine mais plus orangé et les écailles sont plus petites
Ventre, région anale	Orangée et avec un dessin écaillé en noir et blanc
Ailes	Rémiges et couvertures alaires noirâtres avec un clair liséré plus évident dans ces dernières
Croupion	Gris-brun tachetée en noir et blanc
Queue	Courte, d'une couleur châtain-orangée avec deux rectrices centrales brunes fonces Châtain-orangée.
Bec	Grisâtre, plus foncé vers l'extrémité; long et pointu
Yeux	Noirs et grands avec cercle oculaire clair
Pattes, doigts	Brunâtres.
Ongles	Noirâtres.

Remarques : *Femelle : Couleurs plus pâles et ternes. En général d'une couleur brunâtre et très tachetée, spécialement sur la poitrine et le ventre où les tâches ont une forme d'écailles*

Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus) mâle
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14.5cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Couronne et nuque : rouge carmin Joues : brunes avec un voile rose.
Cou, nuque	
Dos	Brun, voilé de rose
Poitrine, gorge	
Flancs	
Ventre, région anale	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Bec	Brun
Yeux	Brun
Pattes, doigts	
Ongles	

Remarques :

~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps :

Zones du plumage	Couleur
Tête	
Cou, nuque	
Dos	
Poitrine, gorge	
Flancs	
Ventre, région anale	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Bec	
Yeux	
Pattes, doigts	
Ongles	

Remarques :

~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps :

Zones du plumage	Couleur
Tête	
Cou, nuque	
Dos	
Poitrine, gorge	
Flancs	
Ventre, région anale	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Bec	
Yeux	
Pattes, doigts	
Ongles	

Remarques :

~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps :

Zones du plumage	Couleur
Tête	
Cou, nuque	
Dos	
Poitrine, gorge	
Flancs	
Ventre, région anale	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Bec	
Yeux	
Pattes, doigts	
Ongles	

Remarques :

~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps :

Zones du plumage	Couleur
Tête	
Cou, nuque	
Dos	
Poitrine, gorge	
Flancs	
Ventre, région anale	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Bec	
Yeux	
Pattes, doigts	
Ongles	

Remarques :

~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps :

Zones du plumage	Couleur
Tête	
Cou, nuque	
Dos	
Poitrine, gorge	
Flancs	
Ventre, région anale	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Bec	
Yeux	
Pattes, doigts	
Ongles	

Remarques :