

*Standard de la
faune
européenne
Fringillidés*



Fringillidés Edition 2013

Standard COM/OMJ

Table des matières

Tarin des aulnes mâle (<i>Carduelis spinus</i>).....	17
~ Phénotype sauvage ~	17
Tarin des aulnes femelle (<i>Carduelis spinus</i>).....	18
~ Phénotype sauvage ~	18
Tarin des aulnes mâle (<i>Carduelis spinus</i>).....	19
~ Mutation brune ~	19
Tarin des aulnes femelle (<i>Carduelis spinus</i>).....	20
~ Mutation brune ~	20
Tarin des aulnes mâle (<i>Carduelis spinus</i>).....	21
~ Mutation brune diluée ~.....	21
Tarin des aulnes femelle (<i>Carduelis spinus</i>).....	22
~ Mutation brune diluée ~.....	22
Tarin des aulnes mâle (<i>Carduelis spinus</i>).....	23
~ Mutation brune double diluée ~.....	23
Tarin des aulnes femelle (<i>Carduelis spinus</i>).....	24
~ Mutation brune double diluée ~.....	24
Tarin des aulnes mâle (<i>Carduelis spinus</i>).....	25
~ Mutation diluée ~.....	25
Tarin des aulnes femelle (<i>Carduelis spinus</i>).....	26

~ Mutation diluée ~	26
Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)	27
~ Mutation double diluée ~	27
Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)	28
~ Mutation double diluée ~	28
Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)	29
~ Mutation agate ~	29
Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)	30
~ Mutation agate ~	30
Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)	31
~ Mutation agate dilué ~	31
Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)	32
~ Mutation agate dilué ~	32
Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)	33
~ Mutation isabelle ~	33
Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)	34
~ Mutation isabelle ~	34
Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)	35
~ Mutation isabelle dilué ~	35
Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)	36
~ Mutation isabelle dilué ~	36
Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)	37

~ Mutation ivoire ~	37
Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)	38
~ Mutation ivoire ~	38
Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)	39
~ Mutation agate ivoire ~	39
Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)	40
~ Mutation agate ivoire ~	40
Sizerin cabaret (Carduelis flammea cabaret)	42
~ Phénotype sauvage ~	42
Sizerin flammé (Carduelis flammea flammea)	43
~ Phénotype sauvage ~	43
Sizerin	44
Mutation brune	44
Sizerin	45
~ Mutation Pastel (ex-agate) ~	45
Sizerin	46
~ Mutation brun pastel (ex-isabelle) ~	46
Sizerin	47
~ Mutation écaillée (ex- pastel).....	47
Sizerin	48
~ Mutation brun écaillé (ex-brun pastel)~	48
Sizerin	49

~ Mutation facteur foncé ~	49
Sizerin	50
~ Mutation pastel facteur foncé (ex-agate foncé)~	50
Sizerin	51
~ Mutation brun facteur foncé ~	51
Sizerin	52
~ Mutation phaéo ~	52
Sizerin blanchâtre (<i>Carduelis hornemanni</i>).....	53
~ Phénotype sauvage ~	53
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	59
~ Phénotype sauvage ~	59
Chardonneret élégant	60
~ Mutation brun ~	60
Chardonneret élégant	61
~ Mutation agate ~	61
Chardonneret élégant	62
~ Mutation pastel ~	62
Chardonneret élégant	63
~ Mutation isabelle ~	63
Chardonneret élégant	64
~ Mutation satiné ~	64
Chardonneret élégant	65

~ Mutation blanc avec masque orange ~	65
Chardonneret élégant	66
~ Mutation tête blanche ~	66
Chardonneret élégant	67
~ Mutation jaune ~	67
Chardonneret élégant	68
~ Mutation aminet ~ (antérieurement dénommé à tort Eumo)	68
Verdier d'Europe mâle (Carduelis chloris chloris)	72
~ Phénotype sauvage ~	72
Verdier d'Europe femelle (Carduelis chloris chloris)	73
~ Phénotype sauvage ~	73
Verdier d'Europe mâle	74
~ Mutation isabelle ~	74
Verdier d'Europe femelle	75
~ Mutation isabelle ~	75
Verdier d'Europe mâle	76
~ Mutation agate ~	76
Verdier d'Europe femelle	77
~ Mutation agate ~	77
Verdier d'Europe mâle	78
~ Mutation brun ~	78
Verdier d'Europe femelle	79

~ Mutation brun ~	79
Verdier d'Europe mâle	80
~ Mutation satiné ~	80
Verdier d'Europe femelle	81
~ Mutation satiné ~	81
Verdier d'Europe mâle	82
~ Mutation lutino ~	82
Verdier d'Europe femelle	83
~ Mutation lutino ~	83
Verdier d'Europe.....	84
~ Mutation pastel ~	84
Verdier d'Europe mâle	85
~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude)~	85
Verdier d'Europe femelle	86
~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude) ~	86
Verdier d'Europe.....	87
~ Mutation isabelle pastel (dénomination provisoire en étude) ~	87
Verdier d'Europe.....	88
~ Mutation brun pastel (dénomination provisoire en étude) ~	88
Linotte mélodieuse mâle (Carduelis cannabina)	90
~ Phénotype sauvage ~	90
Linotte mélodieuse femelle (Carduelis cannabina)	91

~ Phénotype sauvage ~	91
Linotte à bec jaune (<i>Carduelis flavirostris</i>)	93
~ Phénotype sauvage ~	93
Bouvreuil pivoine (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	99
~ Phénotype sauvage ~	99
Bouvreuil pivoine	100
~ Mutation pastel ~	100
Bouvreuil pivoine mâle	101
Mutation brun ~	101
Bouvreuil pivoine femelle	102
~ Mutation brun ~	102
Bouvreuil pivoine mâle	103
~ Mutation brun pastel ~	103
Bouvreuil pivoine femelle	104
~ Mutation brun pastel ~	104
Bouvreuil pivoine	105
~ Mutation blanc ~	105
Bouvreuil pivoine	106
~ Mutation jaune ~	106
Bouvreuil pivoine	107
~ Mutation brun pastel jaune ~	107
Bouvreuil pivoine mâle	108

~ Mutation topaze ~	108
Bouvreuil pivoine femelle	109
~ Mutation topaze ~	109
Pinson des arbres mâle (Fringilla coelebs)	112
~ Phénotype sauvage ~	112
Pinson des arbres femelle (Fringilla coelebs)	113
~ Phénotype sauvage ~	113
Pinson des arbres mâle	114
~ Mutation brun ~	114
Pinson des arbres femelle	115
~ Mutation brun ~	115
Pinson des arbres mâle	116
~ Mutation agate ~	116
Pinson des arbres femelle	117
~ Mutation agate ~	117
Pinson des arbres mâle	118
~ Mutation opale ~	118
Pinson des arbres femelle	119
~ Mutation opale ~	119
Pinson des arbres	120
~ Mutation brun opale ~	120
Pinson du nord mâle (Fringilla montifringilla)	122

~ Phénotype sauvage ~	122
Pinson du nord femelle (<i>Fringilla montifringilla</i>)	123
~ Phénotype sauvage ~	123
Serin cini mâle (<i>Serinus serinus</i>).....	126
~ Phénotype sauvage ~	126
Serin cini femelle (<i>Serinus serinus</i>).....	127
~ Phénotype sauvage ~	127
Venturon montanard mâle (<i>Serinus cintrinella</i>)	129
~ Phénotype sauvage ~	129
Venturon montagnard femelle (<i>Serinus cintrinella</i>)	130
~ Phénotype sauvage ~	130
Venturon montagnard corse (<i>Serinus cintrinella corsica</i>)	131
~ Phénotype sauvage ~	131
Bec croisé des sapins mâle (<i>Loxia curvirostra</i>).....	134
~ Phénotype sauvage ~	134
Bec croisé des sapins femelle (<i>Loxia curvirostra</i>).....	135
~ Phénotype sauvage ~	135
Bec croisé bifascié mâle (<i>Loxia leucoptera</i>)	137
~ Phénotype sauvage ~	137
Bec croisé bifascié femelle (<i>Loxia leucoptera</i>)	138
~ Phénotype sauvage ~	138
Bec croisé perroquet mâle (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)	140

~ Phénotype sauvage ~	140
Bec croisé perroquet femelle (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)	141
~ Phénotype sauvage ~	141
Durbec des sapins mâle (<i>Pinicola enucleator</i>)	145
~ Phénotype sauvage ~	145
Durbec des sapins femelle (<i>Pinicola enucleator</i>)	146
~ Phénotype sauvage ~	146
Gros bec casse-noyaux mâle (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	149
~ Phénotype sauvage ~	149
Gros bec casse-noyaux femelle (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	150
~ Phénotype sauvage ~	150
Roselin githagine (<i>Rhodopechys githaginea</i>)	153
~ Phénotype sauvage ~	153
Mutations de la faune européenne homologuées par la COM/OMJ	156

Ont participé à l'élaboration de ce standard :

Jacques Faivre, François Vuillaume, Enrique Gomez, Lionel Durochat.

Documentations : UOF, FOI, FOA, KBOF

Photographies : P. Rocher, E. Gomez, S. Chartier, R. Driesmans, J.-M. Eytorff, B. Comelieu, A Cupido, Cazadilla, L. Durochat, R. Rojas, A. Van Mingeroet, P. Malburet, J.-P. Hennbique

Merci aux auteurs de nous avoir permis la publication de leurs photos

Un merci tout particulier à Hermann Heinzl pour ses illustrations

Terminé le 23 juillet 2012

La reproduction et l'utilisation de ces documents sont interdites sans l'autorisation de leurs auteurs ainsi que de la COM/OMJ.

Fringillidés

Genre Carduelis



Tarin des aulnes

(*Carduelis spinus*)



Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Noirs avec la calotte légèrement pointillé de gris.
Joues, région auriculaire	Jaune grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers	Jaunâtres partant de derrière l'œil et s'élargissant vers le cou.
Cou, nuque, scapulaires, dos	Verdâtres avec de fines stries foncées.
Poitrine, gorge	Vert jaunâtre. Certains mâles ont une petite bavette (nullement obligatoire) noire sur le haut de la gorge, elle doit être petite et régulière.
Flancs	Gris verdâtre avec des stries noirâtres qui doivent être bien régulières de chaque côté duc corps.
Ventre, région anale	Légèrement grisâtre.
Ailes	Grandes rémiges noir brunâtre avec le vexille externe jaune. Rémiges secondaires liserées de grisâtre à leur extrémité. Barre alaire jaune et petit miroir jaune.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité noire. Rectrices médianes noires.
Bec	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Noirs.



Photo Rocher Philippe

Remarque : les jeunes oiseaux peuvent montrer de légères lunettes.

Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Grisâtres avec de fines stries entrecoupées.
Joues, région auriculaire	Brunâtres voilés jaune.
Traits sourciliers	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle mais plutôt de couleur brun grisâtre.
Cou, épaules, dos	Grisâtres finement striés de brun noirâtre.
Poitrine, gorge, flancs	Grisâtres dans l'ensemble. Les côtés de la poitrine et surtout les flancs ont un beau dessin strié, bien régulier, net, de couleur gris foncé.
Ventre, région anale	Grisâtres.
Ailes	Gris foncé avec les mêmes marques que le mâle.
Croupion	Jaune verdâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue	Deux premiers tiers jaune, le reste est noir-gris. Rectrices médianes noir-gris.
Sous-caudales	Présence d'un dessin écaillé.
Bec	Fin, pointu, de couleur corne claire, flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Noirs.



Photo Sylvain Chartier

Dimorphisme sexuel : les femelles doivent avoir une couleur de fond la plus grise possible.

Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation brune ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, occiput, vertex	Brun très foncé. La calotte est nuancée et pointillée de beige.
Joues	Jaune verdâtre lavées de brun.
Traits sourciliers	Jaunes.
Gorge	Bavette brun foncé si elle est présente.
Poitrine	Verdâtre lavée de beige.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité brun très foncé. Rectrices médianes brunes, très foncées.
Ailes	Grandes rémiges brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. Epauls jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Flancs	Couleur de fond blanc jaunâtre avec stries brun foncé.
Dos	Manteau couleur verdâtre strié de brun avec un voile brun clair sur le dos.
Bec	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Bruns.
Ongles	Foncés.

Photo Philippe ROCHER



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation brune ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, occiput, vertex	Brun verdâtre striés de brun foncé.
Joues	Grisâtres lavées de brun.
Traits sourciliers	Jaunâtres.
Croupion	Jaune verdâtre légèrement strié de brun.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun foncé. Rectrices médianes brunes, très foncées.
Ailes	Grandes rémiges brun foncé avec un léger liseré jaune le long du vexille externe. Rémiges secondaires au liseré jaunâtre avec barre alaire chamois et miroir jaune pâle.
Epaules	Jaune verdâtre lorsqu'elles sont visibles.
Poitrine	Blanc sale striée de brun.
Flancs	Couleur de fond beige avec stries brun foncé.
Dos	Manteau verdâtre lavé de brun assez foncé strié de brun foncé.
Bec	Couleur corne à la base avec l'extrémité de la mandibule supérieure brun noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Bruns.
Ongles	Foncés.



Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation brune diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Bruns, lavés de vert. Vertex écaillé de beige.
Trait oculaire	Jaune.
Joues	Jaunâtres, lavées de brun.
Dos	Vert brunâtre strié de brun foncé.
Gorge, poitrine	Jaune clair avec un léger voile beige. Bavette brun foncé. Poitrine plus claire.
Flancs	Jaunâtres lavés de beige à l'avant et grisâtre lavé de beige à l'arrière. Stries brunes.
Ailes	Rémiges diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre. Couvertures terminées par du jaune verdâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaune verdâtre bordée de brun clair.
Croupion	Jaune verdâtre strié de brun foncé
Queue	Deux premiers tiers jaunâtres et extrémité gris brun. Rectrices médianes gris brun, très foncées. Sous-caudales jaune verdâtre striées de brun foncé.
Bec	Brunâtre, flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles, yeux	Brun foncé.

Jean-Pierre Hennbique



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation brune diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Bruns striés de brun foncé.
Trait oculaire	Jaune clair.
Joues	Jaunâtres lavées de brun foncé.
Poitrine, gorge	Gris clair légèrement striée de brun
Flancs	Gris clair lavé de beige. Stries brun foncé.
Croupion	Jaune verdâtre strié de brun foncé.
Dos	Brun verdâtre strié de brun foncé.
Ailes	Rémiges diluées en gris brun avec bord du vexille externe jaune brunâtre. Couvertures terminées par du jaunâtre, bordées de brun clair, d'où une bande alaire jaunâtre bordée de brun clair.
Queue	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers bruns. Rectrices médianes brun gris. Sous-caudales gris beige striées de brun.
Bec	Brunâtre flammé de brun foncé à la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Brun foncé.



Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation brune double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, dos	Brun beige. Manteau sans stries.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Brunes striées de blanc.
Gorge, poitrine, flancs	Jaunâtre légèrement striée de brun beige. Bavette pratiquement devenue invisible.
Ventre	Blanc sale.
Couvertures	Petites brun beige ; Moyennes et grandes jaune pâle bordées de jaune foncé.
Rémiges	Secondaires gris très clair avec vexille externe jaune et portant une bande alaire jaune intense. Primaires gris très clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir visible.
Croupion	Jaune strié de brun.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris très clair avec vexille externe jaune. Rectrices médianes gris très clair.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Corne claire.



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation brune double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex et occiput, manteau	Brun beige avec un dessin strié léger. Manteau sans stries.
Traits oculaires	Jaune clair.
Joues	Brunes, striées de blanc.
Gorge, poitrine	Gris très clair. Poitrine striée de brun beige.
Flancs	Beiges, striés de brun.
Croupion	Jaune strié de brun.
Ventre	Blanc sale.
Queue	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers beiges avec vexille externe jaunâtre. Rectrices médianes beiges.
Couvertures	Petites brun beige ; Moyennes et grandes jaunâtres bordée de jaune foncé.
Rémiges	Secondaires beige avec vexille externe jaune pâle et portant une bande alaire jaune. Primaires beiges avec vexille externe jaune pâle. Pas de miroir visible.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Corne claire.





Photo Philippe ROCHER

Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation diluée ~

Taille du corps : 11 cm


Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, dos	Gris très foncé lavé de vert.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Verdâtres lavées de gris.
Dos	Vert strié de gris foncé.
Poitrine, gorge	Vert jaunâtre lavée de gris clair. Bavette gris foncé si elle existe.
Flancs	Gris clair à l'arrière et gris clair lavé de verdâtre à l'avant. Stries gris foncé.
Ventre	Blanc sale.
Couvertures	Se terminent par du vert clair très lumineux qui donne une bande alaire verte avec des épaules vertes. Miroir jaune pâle.
Rémiges, rectrices médianes	Gris verdâtre. Rémiges avec bord du vexille externe jaunâtre.
Croupion, sous-caudales	Jaune verdâtre légèrement strié de gris.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris verdâtre.
Bec	Brunâtre flammé de noir à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncée.
Ongles	foncés.



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, front, occiput	Gris striés de gris foncé.
Traits oculaires	Jaunâtres.
Joues	Gris brun, légèrement striées.
Gorge	Gris très clair légèrement striée de gris.
Poitrine	Gris très clair striée de gris foncé.
Dos	Gris brun, lavé de vert et strié de gris foncé.
Flancs	Gris clair striés de gris foncé avec un voile brun léger.
Croupion	Jaune verdâtre strié de gris.
Queue	Premier tiers jaunâtre et deux derniers tiers gris verdâtre. Rectrices médianes entièrement gris verdâtre. Sous-caudales gris clair striées de gris.
Ailes	Rémiges gris verdâtre avec le bord du vexille externe jaunâtre. Couvertures primaires et secondaires terminées par un bord vert lavé de chamois avec miroir jaune très pâle.
Bec	Brunâtre.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.



Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	Gris brun clair. Vertex avec un léger dessin.
Traits oculaires	Jaunes.
Joues	Gris verdâtre striées de clair.
Gorge	Jaunâtre légèrement striée de brun. Bavette pratiquement invisible.
Poitrine, flancs	Jaunâtre légèrement striée de gris brunâtre.
Ventre	Blanc sale.
Dos	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Croupion	Jaune strié de gris brun.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris clair avec vexille externe jaune. Rectrices médianes gris clair.
Couvertures alaires	Petites : gris brun. Grandes : jaune pâle bordées de jaune intense.
Rémiges	Secondaires : gris clair avec vexille jaune et portant une bande alaire jaune intense. Primaires : gris clair avec vexille externe jaune. Pas de miroir.
Bec	Chair, flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.




Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation double diluée ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	Gris brun clair avec un dessin strié très léger.
Traits oculaires	Jaune clair.
Joues	Gris brun clair, striées de clair.
Gorge, poitrine	Gris clair. Poitrine légèrement striée de gris brun.
Dos	Manteau gris brun jusqu'aux épaules, sans stries.
Flancs	Brun clair, striés de gris brun.
Croupion	Jaune, strié de gris brun.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris clair avec vexille externe jaunâtre. Rectrices médianes entièrement gris clair.
Couvertures alaires	Petites : gris brun. Moyenne : gris verdâtre bordées de jaune intense. Grandes : gris verdâtre bordées de jaune intense.
Rémiges	Secondaires : gris clair avec vexille jaune pâle et portant une bande alaire jaune. Primaires : gris clair avec vexille externe jaune pâle. Pas de miroir.
Bec	Chair flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.

Photo Philippe ROCHER



Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, front	Gris foncé. Nuance de couleur dans la calotte pointillée de gris.
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues, régions auriculaires	Vertes lavées de gris.
Gorge	Bavette gris foncé si elle est présente.
Poitrine, flancs	Vert jaunâtre. Flancs striés de gris très foncé.
Dos	Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires.
Croupion	Verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et extrémité gris très foncé. Rectrices médianes entièrement gris foncé.
Rémiges	Grandes : gris foncé avec bords externes liserés de jaune. Secondaires avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncée.
Ongles	Foncés.



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, front	Gris clair striés de noir.
Traits sourciliers	Gris clair.
Joues, régions auriculaires	Grisâtres.
Poitrine	Gris clair striée de noir dilué.
Dos	Manteau grisâtre de noir dilué.
Flancs	Gris clair avec des tries d'un gris très foncé.
Croupion	Grisâtre légèrement strié de gris foncé.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers gris très foncé. Rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Rémiges	Grandes : gris foncé avec bords externes liserés de jaune. Le liseré des rémiges secondaires est grisâtre. Barre alaire et miroir jaune clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncée.
Ongles	Foncés.



Photo KBOF

Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Hérédité : agate : récessif lié au sexe - dilué : dominant autosomal

Zones du plumage	Couleur
Calotte	Gris foncé.
Traits sourciliers, croupion	Jaunes.
Joues	Jaune verdâtre bien dessinées de gris foncé. Légère décoloration autour du bec.
Gorge	Bavette gris foncé si elle est présente.
Poitrine	Jaune verdâtre voilé de gris
Flancs	Jaunâtres, plus clairs que la poitrine, avec stries gris foncé.
Dos	Vert jaunâtre avec stries gris foncé bien visibles.
Queue	partie supérieure gris foncé. Partie inférieure : les deux premiers tiers jaunes et extrémité gris foncé.
Rémiges	Grandes : gris foncé avec liseré jaune pour le vexille externe. Secondaires : gris foncé avec liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures alaires	Gris foncé. Barre alaire jaune bien visible.
Bec	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair.
Ongles	Couleur corne.



Photo Jean-Michel EYTORFF

Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Hérédité : agate : récessif lié au sexe - dilué : dominant autosomal

Zones du plumage	Couleur
Calotte	Jaune verdâtre claire, striée de gris foncé.
Joues	Jaunes verdâtre lavées de gris.
Gorge	Grisâtre.
Poitrine	Grisâtre avec légères stries gris foncé.
Dos	Vert jaunâtre pâle avec stries dorsales gris foncé bien visibles.
Flancs	Grisâtres, très clairs, striés de gris foncé.
Croupion	Jaunâtre.
Queue	Partie supérieure gris foncé. Partie inférieure : le premier tiers est jaunâtre et le reste est gris foncé.
Rémiges	Grandes : gris foncé avec liseré jaune le long du vexille externe. Secondaires : gris foncé avec un liseré jaune à l'extrémité.
Couvertures	Gris foncé. Barre alaire jaunâtre.
Bec	Couleur chair flammé à la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.



Photo RBOF

Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation isabelle ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput	Brun clair. Photo FOI
Traits sourciliers	Jaunes.
Joues	Brun clair lavées de jaune.
Gorge, poitrine	Jaunes. Bavette brun claire si elle existe.
Flancs	Jaunâtres avec stries brun clair.
Dos	Manteau brun clair très légèrement strié.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Jaune.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et le reste est brun clair. Rectrices médianes entièrement brunes.
Rémiges	Grandes : brun clair avec liseré jaune. Bandes alaires et miroir jaune.
Couvertures alaires	Petites : brun clair. Moyennes : brun clair avec liseré jaune (bande alaire). Grandes : brun clair avec liseré jaune.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation isabelle ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, dos	Blanc sale lavées de jaune et striés de brun clair.
Traits sourciliers	Jaune clair et peu visibles.
Joues	Jaunâtres striées de brun clair.
Gorge	Blanc sale
Poitrine	Blanc sale lavée de jaune pâle avec stries brun clair sur le haut de la poitrine.
Flancs	Blanc sale striés de brun clair.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Blanc sale lavé de jaune.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers brun clair. Rectrices médianes entièrement brunes.
Ailes	Identiques aux ailes des mâles mais avec un jaune moins intense.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo KBOF

Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation isabelle dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Vertex, occiput, joues	Jaunes, voilés de beige.
Traits sourciliers	Jaunes mais peu visibles.
Gorge, poitrine, dos, croupion	Jaunes, voilés de beige. Pas de stries.
Flancs	Jaunes légèrement striés de beige.
Ventre	Blanc sale.
Queue	Deux premiers tiers jaunes et le reste est beige clair. Rectrices médianes entièrement beiges.
Rémiges	Beige clair avec liserés jaunes.
Couvertures alaires	Jaunes avec liserés et extrémités beige clair. Barre alaire visible.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo Jean-Michel EYTORFF

Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation isabelle dilué ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Beige clair lavés de jeune.
Traits sourciliers	Jaune clair.
Gorge, poitrine	Blanc sale avec le moins de jaune possible.
Dos	Manteau jaune lavé de beige et légèrement strié.
Flancs	Blanc sale striés de beige clair.
Ventre	Blanc sale.
Croupion	Jaune lavé de beige clair.
Queue	Premier tiers jaune et deux derniers tiers beiges. Rectrices médianes entièrement beiges.
Couvertures	Jaunes avec liserés et extrémités beiges.
Rémiges	Beiges avec liseré jaune.
Bec	Chair, flammé de brun à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.




Photo Jean-Michel EYTORFF

Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation ivoire ~

Taille du corps : 11 cm

Photo A. Van Mingeroet

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Noirs. Calotte légèrement pointillée de gris.
Joues, région auriculaire	Jaune ivoire grisâtre légèrement voilé.
Traits sourciliers	Jaune ivoire, partant de derrière l'œil et s'élargissant vers le cou.
Cou, dos	Nuque gris verdâtre avec de fines stries très foncées.
Gorge, poitrine, épaules	Vert gris. Certains mâles ont une petite bavette noire et régulière sur le haut de la gorge.
Flancs	Gris vert avec des stries noires bien régulières. La couleur devient plu claire vers l'arrière des flancs.
Ventre	Région anale légèrement grisâtre.
Croupion	Gris vert.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité noire. Deux rectrices médianes noires.
Rémiges	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune ivoire. Barre alaire et petit miroir jaune ivoire.
Bec	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Noirs.



Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation ivoire ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput	Grisâtres avec de fines stries.
Joues, région auriculaire	Brunâtres, voilées de jaune ivoire.
Traits sourciliers	Beaucoup moins jaunes que chez le mâle et plutôt brun grisâtre.
Cou, dos, épaules	Grisâtres finement striés de noir brunâtre.
Gorge, poitrine, flancs	Grisâtre dans l'ensemble. Côtés de la poitrine et flancs avec un beau dessin strié régulier et net de couleur gris foncé.
Ventre	Grisâtre.
Croupion	Gris vert légèrement strié de gris foncé.
Queue	Premier tiers des rectrices jaune ivoire, le reste est noir gris. Deux rectrices médianes noir gris. Sous-caudales avec dessin écaillé.
Ailes	Gris foncé avec les mêmes marques que les mâles.
Bec	Couleur corne claire flammé de noir.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Noirs.



Photo Bernard CORMELIAU

Tarin des aulnes mâle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate ivoire ~

Taille du corps : 11 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Gris foncé. Calotte pointillée de gris.
Joues, région auriculaire	Vertes lavées de gris.
Traits sourciliers	Jaune ivoire.
Dos	Manteau verdâtre voilé de gris avec des stries noires.
Gorge, poitrine, flancs	Vert jaunâtre ivoire. Flancs à stries grises très foncées. Gorge avec parfois une bavette gris foncé.
Croupion	Verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune ivoire et extrémité gris très foncé. Deux rectrices médianes entièrement gris foncé.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. Rémiges secondaires avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.



Photo Jean-Michel EYTORFF

Tarin des aulnes femelle (Carduelis spinus)
~ Mutation agate ivoire ~

Taille du corps : 11 cm


Zones du plumage	Couleur
Front, vertex, occiput, calotte	Gris clair striés de noir.
Joues, région auriculaire	Grisâtres.
Traits sourciliers	Gris clair.
Dos	Manteau grisâtre strié de noir dilué.
Poitrine	Gris clair strié de noir dilué.
Flancs	Couleur de fond gris clair avec des stries d'un gris très foncé.
Croupion	Grisâtre, légèrement strié de gris foncé.
Queue	Le premier tiers des rectrices jaune ivoire et le reste est gris très foncé. Deux rectrices médianes entièrement gris très foncé.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec bords externes liserés de jaune ivoire. Rémiges secondaires avec liseré grisâtre. Barre alaire et miroir jaune ivoire clair.
Bec	Couleur chair flammé.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Foncés.




Photo Jean-Michel EYTORFF

Sizerin flammé


Carduelis flammea cabaret
1^{ère} année




Carduelis flammea cabaret
adulte



Carduelis flammea flammea
1^{ère} année



Carduelis flammea flammea
adulte



Sizerin cabaret (Carduelis flamma cabaret)
 ~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 11.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brunâtre. La moitié du vertex est rouge carmin ou jaune brun selon les spécimens.
Joues, région auriculaire	Brun foncé. Dessin en forme de demi-lune.
Traits sourciliers	Couleur légèrement brunâtre. Étroits et réguliers. Du dessus des yeux à la nuque.
Cou, dos, épaules	Bruns avec des stries étroites et régulières brun foncé.
Gorge	Brun chaud. Petite bavette brun foncé.
Poitrine	Haut et côtés rose carmin, parfois brun chaud.
Flancs, ventre	Blanc sale. Flancs régulièrement striés de fines raies brun foncé qui partent à la hauteur des épaules et qui descendent tout le long des flancs.
Ailes, queue	Grandes rémiges et rectrices brun très foncé, liserées de brun très pâle aux extrémités. Deux barres alaires beige léger.
Croupion	Lavé de rose carmin ou brun chaud, strié de brun foncé.
Bec	Fin et pointu. Mandibule supérieure brunâtre et inférieure jaunâtre.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts	Brun foncé.
Ongles	Noirs.

Photo UOF



Sizerin flammé (Carduelis flammæ flammæ)
~ Phénotype sauvage ~

Différence avec le sizerin cabaret :

- Plus grand en taille (13 - 15 cm)
- Couleur de fond plus pale, brun beige
- Stries brunes légèrement plus claires
- Barres alaires plus claires et plus visibles
- Tache plus claire dans le dos (caractéristique de l'espèce)



Photo UOF Pierre Malburet



Sizerin *Mutation brune*

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun beige. Vertex rouge rosé.
Joues, région auriculaire	Brunes.
Traits sourciliers	Beiges.
Dos	Brun chaud avec des stries brun foncé étroites et régulières.
Gorge	Brune avec bavette d'un brun plus foncé.
Poitrine, flancs	Brun clair. Stries brun chaud sur le haut de la poitrine et des épaules vers l'arrière pour les flancs. Chez le mâle adulte, la poitrine peut être brun lavé de rose.
Ventre	Blanc sale.
Ailes, queue	Grandes rémiges et rectrices brunes avec liseré beige au bout des pennes. Barres alaires légèrement plus claires.
Croupion	Brun strié de brun chaud et lavé de rose.
Bec	Fin et pointu. Mandibule supérieure brunâtre et inférieure jaunâtre.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Yeux, ongles	Brun foncé.



Photo FOI



Photo UOF

Sylvain Chartier

Dimorphisme sexuel : teintes et marques identiques chez les femelles mise à part la poitrine et les flancs légèrement plus clairs. Pas de rose sur la poitrine et le croupion.

Sizerin
~ *Mutation Pastel (ex-agate)* ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Gris beige. La moitié du vertex est rouge rose ou parfois jaune brun.
Joues, région auriculaire	Gris brun lavé de rose. Dessin en forme de demi-lune.
Traits sourciliers	Gris beige. Etroits et réguliers, du dessus des yeux à la nuque.
Dos, cou, épaules	Gris clair avec stries régulières gris foncé.
Gorge	Gris clair avec petite bavette gris foncé.
Poitrine	Gris clair, parfois rosée, avec stries grises sur le haut.
Flancs	Gris clair avec stries grises régulières du haut de la poitrine et descendant le long des flancs.
Ventre	Blanc sale.
Ailes, queue	Grandes rémiges et rectrices gris foncé avec liseré gris clair à l'extrémité des plumes. Deux barres alaires gris clair.
Croupion	Gris clair strié de gris foncé.
Bec	Jaunâtre avec mandibule supérieure flammée.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Grisâtres.
Ongles	Noirs.



Photo Bernard COMELIAU

photo F'OI



Bec rouge

Sizerin
 ~ *Mutation brun pastel (ex-isabelle)* ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Beige. La moitié du vertex est rouge rose ou parfois jaune brun.
Joues, région auriculaire	Beiges lavées de rose. Lorums beiges.
Traits sourciliers	Beiges.
Dos	Beige clair avec stries brun clair.
Gorge	Beige clair avec petite bavette brun clair.
Poitrine	Beige clair, parfois rose, avec stries brun clair sur le haut.
Flancs	Beige clair striés de brun clair du haut de la poitrine et descendant le long des flancs.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires beige clair. Rémiges secondaires brun clair. Couvertures brun clair avec extrémités beige clair formant les bandes alaires.
Queue	Rectrices beige clair avec liseré plus clair très peu visible.
Croupion	Beige clair striés de brun clair, parfois lavé de rose.
Bec	Jaunâtre avec mandibule supérieure flammée.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.

Photo Philippe ROCHER



Sizerin
~ Mutation écaillée (ex- pastel)

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brune striée de brun foncé.
Joues	Brunes avec région auriculaire brun foncé.
Dos, flancs	Bruns striés de brun foncé.
Gorge	Petite bavette grisâtre.
Poitrine	Brun chaud.
Ailes, queue	Rémiges primaires et secondaires brun foncé avec liseré beige. Couvertures brunes avec liseré brun roux. Barres alaires brun beige bien visibles.
Queue	Brune avec liseré beige.
Croupion	Beige clair striés de brun foncé.
Bec	Jaune avec bout de la mandibule supérieure brune.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Chair foncé.
Ongles	Noirs.



Photo Orizsmans

Sizerin
 ~ *Mutation brun écaillé (ex-brun pastel)*~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun clair avec calotte rouge.
Joues	Brunes.
Nuque	Brune avec légères stries plus brunes.
Dos	Brun avec stries plus brunes.
Gorge	Bavette grisâtre.
Poitrine	Brune sans stries visibles.
Flancs	Bruns avec stries légèrement visibles.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires gris beige avec liserés brun clair. Rémiges secondaires et couvertures gris beige avec liserés bruns très visibles.
Queue, croupion	Gris beige avec liserés bruns.
Bec	Jaune.
Yeux	Noir brun.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



Sizerin
~ *Mutation facteur foncé* ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun foncé avec calotte rouge.
Traits sourciliers	Bruns et légèrement visibles.
Joues	Brunes, très foncées.
Nuque	Brun clair avec des stries brunes.
Lorums	Noirs.
Dos, épaules, cou	Brun foncé avec des stries étroites et régulières noir brun.
Gorge	Brun foncé avec une bavette noire.
Poitrine	Brun foncé avec des stries noir brun sur les côtés et un dessin écaillé noir brun au milieu.
Flancs	Couleur de fond très foncée, stries brun noir fines et régulières partant à la hauteur des épaules et descendant tout le long des flancs.
Ventre	Blanc sale voilé de brun.
Ailes	Rémiges primaires brun très foncé avec liseré clair très étroit. Deux barres alaires brunes.
Queue, croupion	Brun très foncé. Croupion strié de brun noir. Rectrices avec un liseré brun à l'extrémité.
Bec	Foncé avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre.
Yeux, pattes, doigts, ongles	Noirs.



Photo Philippe ROCHER

Sizerin
~ *Mutation pastel facteur foncé (ex-agate foncé)*~

Taille du corps : 12 - 15 cm


Zones du plumage	Couleur
Front, traits sourciliers	Gris beige. Moitié du vertex rouge rose ou jaune brun. Traits sourciliers étroits et réguliers
Joues, région auriculaire	Gris buni lavé de rose, dessin en forme de demi-lune.
Lorums	Grisâtres.
Dos, épaules, cou, croupion	Gris foncé avec des stries et régulières gris foncé. Stries du dos, du cou et des épaules entrecoupées
Gorge	Gris foncé avec une petite bavette gris foncé.
Poitrine	Gris foncé avec des stries grises sur le haut de la poitrine. Elle peut être rose chez les mâles adultes.
Flancs	Gris foncé et régulièrement striés de gris. Les stries partent du haut de la poitrine et descendent le long des flancs.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé liserées de gris clair à l'extrémité des pennes. Deux barres alaires gris foncé.
Queue	Rectrices gris foncé liserées de gris foncé à leur extrémité.
Bec	Jaunâtre avec mandibule supérieure flammée.
Pattes, doigts, ongles	Grisâtres.
Yeux,	Noirs.



Sizerin
~ Mutation brun facteur foncé ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun avec le vertex rouge foncé.
Joues, région auriculaire	Brun foncé.
Lorums	
Dos	Brun foncé avec un léger dessin dorsal.
Gorge	Brun foncé avec une très grande bavette plus foncée.
Poitrine	Brun foncé avec des stries visibles sur le haut de la poitrine.
Flancs	Bruns striés de fines raies brun foncé partant des épaules vers l'arrière.
Ventre	Brun beige.
Ailes	Grandes rémiges brun foncé avec un très petit liseré beige. Barre alaire pratiquement invisible.
Croupion	Brun foncé strié.
Queue	Rectrices brun foncé avec un très petit liseré beige.
Bec	Jaunâtre flammé de brun
Pattes, doigts, ongles	Bruns.
Yeux	Brun foncé.



Sizerin
~ *Mutation phaéo* ~

Taille du corps : 12 - 15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Brun clair non-strié, avec la calotte rouge ou orange.
Nuque	Blanchâtre striée de brun.
Dos	Blanchâtre écaillé de brun.
Gorge, ventre	Blanchâtre.
Poitrine	Blanchâtre avec des écailles brunes sur le haut.
Flancs	Blanchâtres écaillés de brun.
Ailes	Rémiges primaires blanches avec léger liseré externe brun. Rémiges secondaires blanche avec un liseré brun plus large. Couvertures blanchâtres avec un large liseré brun à l'extrémité. Scapulaires blanchâtres avec des écailles brunes.
Croupion	Blanc avec de larges liserés bruns.
Queue	Rectrices blanches avec un liseré brun.
Bec	Jaune à base blanchâtre (comme les contours des yeux et la bavette).
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.
Yeux	Rouges.



Sizerin blanchâtre (Carduelis hornemanni) ~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Conique, fin et pointu de couleur de corne jaunâtre. La mandibule supérieure est plus foncée que l'inférieure.
YEUX	Noir
TETE	Ronde, bien enchâssée dans les épaules. Fine bande frontale et lorums brun-noirâtre. Tache rose carmin en forme de casque partant du front et couvrant la moitié du crâne. Ligne oculaire gris-brun surmontée d'un fin sourcil gris-beige. Arrière du crâne et nuque : gris-beige, striés de noirâtre. Dessin des joues légèrement marqué.
DOS	Beige-grisâtre marqué régulièrement de stries brun noir, avec une zone plus claire au centre.
GORGE	Petite bavette noir-brun au menton. Gorge blanchâtre, un très léger reflet rose peut parfois apparaître,
POITRINE	Blanchâtre comme la gorge, peut être aussi légèrement rose
FLANCS	Beige-grisâtre très clair, striés de brun-noir
VENTRE	Blanc.
AILES	Grandes rémiges : noirâtres, finement liserées de brun clair. Rémiges secondaires : noirâtres, portant un liseré gris-beige plus large. Couvertures : noirâtres, bordées de blanc sale formant une double barre alaire.
CROUPION	Blanchâtre, légèrement strié ou lavé de rose accepté
QUEUE	Rectrices : noirâtres, portant un liseré gris-beige
PATTES et DOIGTS	Brun-noir.
ONGLES	Noir
FORME GENERALE	Assez ronde, trapue et élégante



Chardonneret élégant

(*Carduelis carduelis carduelis*)

Mâle



Femelle



Chardonneret élégant (major)

(*Carduelis carduelis major*)



Taille 14/16 cm

- marque de nuque blanche et importante,
- joues, gorge, champignons blancs,
- brides du casque larges, très noires contournant l'arrière de la joue,
- dessin pectoral chamois intense et présentant souvent des traces noirâtres
sont larges et bien nettes,
- flancs chamois bien marqués,
- croupion blanc lavé de beige.

Chardonneret élégant (britannica)

(*Carduelis carduelis britannica*)



Taille : 12/ 12,5 cm

- marque de nuque étroite, blanc sale,
- gorge et joues, fortement lavées de beige,
- champignons et ventre blancs et ternes,
- flancs et dessin pectoral brun,
- manteau brun foncé,
- croupion blanc sale fortement lavé de brun.

Chardonneret élégant (parva)

(*Carduelis carduelis parva*)



Taille 10,5/11 cm

- marque de nuque blanche et étroite,
- joues, gorge, champignons et ventre blancs,
- dessin pectoral et flancs chamois,
- croupion blanc lavé de beige,
- bec long, fort et pointu qui peut parfois paraître disproportionné avec la taille de l'oiseau

Chardonneret élégant (tschusii)

(*Carduelis carduelis tschusii*)



Taille 11 cm,

- marque de nuque quasiment inexistante,
- joues lavées de brun,
- gorge, champignons et ventre blancs,
- dessin pectoral et flancs chamois,
- manteau brun jusqu'à la base du casque
- croupion blanc lavé de beige,
- bec long, fort et pointu (moins long que chez parva)

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) ~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le brun du dos.
Dos	Brun foncé.
Calotte, nuque, lorums épaules, ailes	Noirs. Large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Poitrine	Brune sur les côtés avec un champignon blanc au centre.
Flancs	Brunâtre en s'éclaircissant vers le ventre.
Ventre	Blanc.
Croupion	Blanchâtre.
Queue	Noire. Points blancs à l'extrémité de chaque rectrice. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Bec, pattes, doigts	Couleur chair. Extrémité du bec noire et effilée.
Ongles	Foncés.



Photos Philippe ROCHER



Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non noire comme chez les mâles.

Chardonneret élégant ~ Mutation brun ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, épaules, lorums	Brun foncé.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le brun de la nuque et le brun du dos.
Dos	Brun chaud uniforme.
Poitrine	Brun chaud avec champignon blanc au centre.
Flancs	Bruns en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Brun foncé avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de brun.
Queue	Brun foncé, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.

Photo UOF Malburgt



Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.

Chardonneret élégant ~ *Mutation agate* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate. Derrière le masque, large tache blanche sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, épaules, lorums	Noirs.
Cou	Collier blanc dans la nuque séparant le noir de la nuque et le gris beige du manteau.
Dos	Gris beige uniforme.
Poitrine	Gris beige avec champignon blanc au centre.
Flancs	Gris beige en s'éclaircissant vers l'arrière.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Noires avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de gris beige.
Queue	Noire, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, bec	Couleur chair. Extrémité du bec flammée de noir.
Ongles	Foncés.



Photo UOF Jean-Pierre Hennbique

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.

Chardonneret élégant *~ Mutation pastel ~*

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange avec dessin gris sur le crâne et la nuque.
Joues	Blanc sale.
Gorge	Blanc sale sous le masque.
Dos, flancs	Gris brun clair.
Poitrine	Gris brun clair avec champignon blanc au centre.
Ailes	Rémiges primaires et secondaires gris foncé le plus égal possible avec extrémités blanches. Miroir jaune.
Couvertures	Gris foncé.
Croupion	Gris brun clair se transformant en blanc sale vers la queue.
Queue	Rectrices grises avec taches blanches sur les deux rectrices externes.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



Chardonneret élégant ~ *Mutation isabelle* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, lorums	Brun beige.
Cou	Collier blanc séparant le brun beige de la nuque et le brun beige du manteau.
Dos, flancs	Brun beige. Les flancs s'éclaircissent vers l'arrière.
Epaules	Brunes.
Poitrine	Brun beige avec champignon blanc au centre.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Brun beige avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de gris.
Queue	Brun beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Bruns.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



Photo UOF Pierre Malburgt

Dimorphisme sexuel : chez la femelle, couverture des épaules brun verdâtre et non brune comme chez les mâles.

Chardonneret élégant ~ *Mutation satiné* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge orange englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, lorums	Beiges.
Cou, gorge	Blancs. Collier blanc séparant le beige de la nuque et le beige du dos.
Dos	Blanc voilé de beige.
Epaules	Beiges.
Poitrine	Blanc sale voilé de beige avec champignon banc visible au centre.
Flancs	Blanc sale légèrement voilé de beige.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Beiges, avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Blanchâtre lavé de beige.
Queue	Beige, avec pointillés blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie inférieure des rectrices externes.
Yeux	Rouges.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



Chardonneret élégant
~ Mutation blanc avec masque orange ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Blanche. Masque orange qui ne va pas jusqu'à la base du bec.
Dos	Blanc.
Poitrine	Blanche.
Flancs	Blancs.
Rémiges	Rémiges primaires blanches avec un liseré jaune dans leur partie médiane. Rémiges secondaires blanches.
Couvertures	Couvertures primaires blanches avec quelques plumes jaunes. Couvertures secondaires et tertiaires blanches.
Croupion	Blanc.
Queue	Blanche avec un léger liseré jaune.
Bec	Couleur chair, légèrement flammé à l'extrémité de la mandibule supérieure.
Yeux	Noirs.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Blancs.



Photo RBOF

Chardonneret élégant ~ *Mutation tête blanche* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Absence de casque noir remplacé par une couleur blanche la plus uniforme possible (crâne, lorums, nuque). Seules subsistent de chaque côté de la tête les traces des brides du casque, de forme triangulaire et de couleur rouge ou orange.
Masque	Rouge lumineux, qui peut-être plus étendu sur la face et le front.
Cou, gorge	Mêmes caractéristiques que le phénotype sauvage, avec des miroirs alaires qui s'étendent aux grandes couvertures et pouvant remonter à la pliure de l'épaule (il est aussi visible à l'envers de l'aile).
Dos	
Epaules	
Poitrine	
Flancs	
Ventre	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Yeux	
Pattes, doigts, ongles, bec	Cette mutation récessive autosomale a été transposée aux autres mutations existantes (brun, agate, etc.)



Photo Sylvain Chartier

Chardonneret élégant ~ *Mutation jaune* ~

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	<p>L'ensemble du plumage présente une suffusion jaune, visible surtout sur les parties dépourvues de pigments mélaniques : joues, nuque, poitrail, croupion.</p> <p>La couleur jaune doit être pure, intense, le plus uniforme possible.</p> <p>Le masque facial est très lumineux, plus étendu et plus diffus que chez les sujets présentant le patron classique.</p> <p>Cette mutation à hérédité dominante a été transposée à toutes les variétés existantes.</p>
Calotte, nuque, lorums	
Cou, gorge	
Dos	
Epaules	
Poitrine	
Flancs	
Ventre	
Ailes	
Croupion	
Queue	
Yeux	
Pattes, doigts, ongles, bec	




Chardonneret élégant
 ~ *Mutation aminet* ~ (antérieurement dénommé à tort *Eumo*)

Taille du corps : 11 – 16 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Masque rouge écarlate englobant le front, le menton, et la moitié des joues jusqu'à l'œil. Derrière le masque, large tache blanche (parfois brune selon les sous-espèces) sur les côtés de la tête et la gorge.
Calotte, nuque, lorums	calotte et lorums le plus noir possible. Nuque blanche.
Cou, gorge	Collier blanc formant une séparation entre le noir de la nuque et le manteau beige-rosé.
Dos	De couleur beige-rosé.
Epaules	marbrées brun-noir chez le mâle et brun verdâtre chez la femelle.
Poitrine	Beige avec voile jaunâtre le champignon est quasiment invisible.
Flancs	Beige très clair voilé de blanc.
Ventre	Blanc.
Ailes	Rémiges noires, avec large barre alaire jaune vif. Points blancs à l'extrémité de chaque rémige.
Croupion	Le plus blanc possible.
Queue	noire, avec points blancs à l'extrémité des rectrices. Grande tache blanche à la partie intérieure des rectrices externes.
Yeux	Brun foncé.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



Comparaison entre agate et aminet



Verdier d'Europe (*Carduelis chloris chloris*)

Mâle



Femelle



Verdier d'Europe

(*Carduelis chloris aurantiventris*)

Taille 14 - 16 cm,



- couleur verte plus lumineuse que chez chloris chloris
- gorge et face ventrale fortement lavées de jaune
- bec et pattes plus clairs que chez chloris chloris
- plus grand et plus coloré que chloris chloris



Verdier d'Europe mâle (Carduelis chloris chloris)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Large, massive, avec le cou bien rempli. Front vert lumineux. Zone loreale et moustache gris-vert
Joues	Gris cendré.
Gorge, épaules	Vert jaunâtre.
Dos	Vert olive avec reflets brunâtres.
Poitrine, flancs	Vert olive.
Ventre	Gris blanchâtre.
Ailes	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité.
Queue	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Chair foncé.



Photo UOF Pierre Malburet

Verdier d'Europe femelle (Carduelis chloris chloris)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	brun grisâtre. Large, massive, avec le cou bien rempli.
Joues	Gris cendré.
Gorge, épaules	Gris-vert.
Dos	brun grisâtre marqué de stries plus foncées.
Poitrine, flancs	brun grisâtre strié.
Ventre	Gris blanchâtre.
Ailes	Grandes rémiges noir brunâtre avec vexille externe jaune. Rémiges secondaires grises avec un liseré noir brunâtre à l'extrémité. Liseré moins large que chez le mâle
Queue	Rectrices jaunes à la base et noir brunâtre à l'extrémité avec un liseré gris le long du vexille externe. Les deux rectrices médianes sont noir brunâtre. Queue courte avec l'extrémité fourchue. Miroir moins large que chez le mâle
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair, flammé de brun. Gros et conique.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Chair foncé.



Verdier d'Europe mâle ~ *Mutation isabelle* ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Jaunâtre.
Couronne, joues, moustaches	Beiges.
Gorge	Jaune.
Dos	Jaune avec léger voile beige bien réparti.
Poitrine, flancs	Jaune avec un voile beige.
Ventre	Jaune devenant blanc vers l'anus.
Ailes	Grandes rémiges brunes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires brunes avec un large liseré beige.
Couvertures	Grandes couvertures beiges. Petites et moyennes couvertures jaunes.
Croupion	Jaune.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.


Remarque : le voile beige est moins visible chez les mâles adultes.



Verdier d'Europe femelle ~ *Mutation isabelle* ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Jaunâtre.
Couronne, joues, moustaches	Beiges.
Gorge	Vert jaunâtre.
Dos	Vert jaunâtre avec léger voile beige bien réparti.
Poitrine, flancs	Vert jaunâtre avec un voile beige.
Ventre	Beige clair.
Ailes	Grandes rémiges brun beige avec vexille externe jaune clair et liseré beige clair à l'extrémité. Rémiges secondaires brun beige.
Couvertures	Grandes couvertures brun beige. Petites et moyennes couvertures vert jaunâtre lavé de beige.
Croupion	Vert jaunâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune pâle et dernier tiers brun avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Brun foncé (yeux isabelle).
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Remarque : la couleur de fond jaune est plus visible chez les adultes.

Verdier d'Europe mâle ~ Mutation agate ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Vert jaunâtre.
Couronne, joues, moustaches	Gris.
Gorge	Vert jaunâtre.
Dos	Vert avec léger voile gris bien régulier.
Poitrine, flancs	Vert jaunâtre avec un voile gris.
Ventre	Vert jaunâtre.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec vexille externe jaune et liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires gris foncé avec un large liseré gris clair.
Couvertures	Grandes couvertures gris argenté. Petites et moyennes couvertures vert jaunâtre.
Croupion	Vert jaunâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo UOF p. Malburgt

Remarque : le voile gris est moins visible chez les mâles adultes.

Verdier d'Europe femelle ~ Mutation agate ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Couronne vert jaunâtre striée de gris. Joues vert jaunâtre lavées de gris. Moustaches grises.
Gorge	Gris clair.
Dos	Vert avec dessin strié gris bien visible.
Poitrine, flancs	Gris clair. Poitrine avec dessin strié gris sur les côtés.
Ventre	Gris clair.
Ailes	Grandes rémiges gris foncé avec vexille externe jaune clair et liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires gris foncé avec un large liseré gris brun.
Couvertures	Grandes couvertures gris brun. Petites et moyennes couvertures vert lavé de gris.
Croupion	Vert jaunâtre voilé de gris
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune clair et dernier tiers gris foncé avec liseré gris clair à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Remarque : la couleur de fond jaune est plus visible chez les adultes.

Verdier d'Europe mâle ~ *Mutation brun* ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun jaunâtre avec un voile gris brun sur les joues. Moustaches plus foncées que les joues. Sourcils plus clairs.
Dos	Brun jaunâtre.
Poitrine	Jaune brun.
Flancs	Brun jaunâtres.
Ventre	Jaunâtre.
Ailes	Grandes rémiges brunes avec vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires brun grisâtre.
Couvertures	Grandes couvertures brun grisâtre. Petites et moyennes couvertures brun jaunâtre.
Croupion	Olive.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers brun avec liseré beige sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Brun.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Photo Philippe ROCHER



Remarque : les mâles adultes ont une couleur de fond jaune, plus visible sur la poitrine.

Verdier d'Europe femelle
~ Mutation brun ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun chaud avec moustaches visibles.
Gorge	brun jaunâtre.
Dos	Brun chaud.
Poitrine	Brune.
Flancs	Brun chaud.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges brunes avec petit vexille externe jaune et liseré beige à l'extrémité. Rémiges secondaires brunes avec un voile gris.
Couvertures	Grandes couvertures brunes avec un voile gris. Petites et moyennes couvertures brun chaud.
Croupion	Brun jaunâtre.
Queue	Premier tiers des rectrices jaune et deux derniers tiers bruns avec liseré beige à l'extrémité sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Bruns.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.

Photo UOF p. Malburgt



Verdier d'Europe mâle *~ Mutation satiné ~*

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Jaune.
Couronne, joues	Beige très clair.
Gorge, croupion	Jaune.
Dos	Jaune avec un voile beige très clair, sans stries.
Poitrine	Jaune avec un voile beige très clair sur les côtés.
Flancs	Jaune avec un voile beige très clair.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges beiges avec vexille externe jaune et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires beige clair.
Couvertures	Grandes couvertures beige clair. Petites et moyennes couvertures jaunes.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaune doré et dernier tiers beige sans liseré sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Photo FOI

Remarque : les mâles adultes ont une couleur de fond est plus jaune sur la poitrine.

Verdier d'Europe femelle
~ *Mutation satiné* ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Jaune clair.
Couronne, joues	Beige très clair.
Gorge	Jaune clair.
Dos	Jaune clair avec un voile beige très clair. Présence d'un léger dessin de stries beiges.
Poitrine, flancs	Jaune clair avec un voile beige très clair.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Grandes rémiges beiges avec vexille externe jaune et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires beige clair.
Couvertures	Grandes couvertures beige clair avec un voile gris. Petites et moyennes couvertures jaunes voilées de beige.
Croupion	Jaune.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers beige sans liseré sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



Photo UOF P. Malburgt

Verdier d'Europe mâle
~ Mutation lutino ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, gorge, dos, poitrine, flancs	Jaunes.
Ventre	Blanc jaunâtre.
Ailes	Grandes rémiges jaunes avec vexille externe jaune doré et liseré beige très clair à l'extrémité. Rémiges secondaires jaunes.
Couvertures	Jaunes.
Croupion	Jaune doré.
Queue	Jaune avec liseré externe jaune doré.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



Photo UOF P. Malburgt

Verdier d'Europe femelle
~ Mutation lutino ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, gorge, dos, poitrine, flancs	Blanc jaunâtre.
Ventre	Blanchâtre.
Ailes	Grandes rémiges blanchâtres avec vexille externe jaune. Rémiges secondaires blanchâtres. Epauls jaunes.
Couvertures	Grandes couvertures jaune blanchâtre. Petites et moyennes couvertures blanchâtres.
Croupion	Jaune.
Queue	Blanchâtre avec petit liseré jaune.
Yeux	Rouges.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts, ongles	Couleur chair.



Verdier d'Europe ~ Mutation pastel ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris vert avec les moustaches et les joues grisâtres.
Dos, poitrine, flancs	Vert olive avec des reflets gris.
Epaules, gorge	Jaune verdâtre.
Ventre	Gris blanchâtre.
Ailes	Rémiges primaires gris foncé avec vexille externe jaune vif. Rémiges secondaires gris clair avec un liseré gris foncé.
Croupion	Vert olive
Queue	Jaune à la base avec l'extrémité gris clair lavée de jaune. un liseré gris plus foncé entoure les rectrices.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair, flammé de brun clair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.



Photo KBOF

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est plus foncé. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes. Très léger dessin dorsal visible.

Remarque : il faut tenir compte qu'il existe des spécimens schimmel et intensifs. Cette différence est bien marquée.

Verdier d'Europe mâle
~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude)~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Couronne, joues, moustaches	Gris clair. Le reste de la tête est vert jaunâtre.
Dos	Vert olive. Voile gris clair bien régulier.
Gorge, poitrine, flancs, croupion	Jaune verdâtre. Poitrine et flancs avec un léger voile gris.
Ventre	Jaune verdâtre plus clair que la poitrine.
Ailes	Rémiges primaires grises, et jaunes le long du vexille externe avec un liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires grises, avec un large liseré gris très clair.
Couvertures	Grandes couvertures gris argenté clair. Petites et moyennes couvertures jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris avec un liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.

Photo J.M. Egtorff



Verdier d'Europe femelle
~ Mutation agate pastel (dénomination provisoire en étude) ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Couronne	Jaune verdâtre avec des stries gris clair.
Joues	Jaune verdâtre lavées de gris clair.
Moustaches	Gris clair.
Dos	Gris avec un dessin strié de gris clair bien visible.
Gorge, poitrine	Jaune verdâtre pâle avec un voile gris argenté léger.
Flancs	Jaune verdâtre pâle avec un voile gris clair et un léger dessin.
Croupion	Jaune verdâtre.
Ventre	Légèrement plus clair que la poitrine.
Ailes	Rémiges primaires grises, et jaunes le long du vexille externe avec un liseré gris clair à l'extrémité. Rémiges secondaires grises, avec un large liseré gris très clair.
Couvertures	Grandes couvertures gris argenté clair. Petites et moyennes couvertures jaune verdâtre.
Queue	Deux premiers tiers des rectrices jaunes et dernier tiers gris avec un liseré gris clair sauf pour les deux rectrices médianes qui n'ont pas de jaune.
Yeux	Noirs.
Bec, pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur corne.

Photo Philippe ROCHER



Verdier d'Europe
 ~ *Mutation isabelle pastel (dénomination provisoire en étude)* ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, lorums, menton, contours des yeux	Masque jaune
Région auriculaire, vertex	Jaunes avec un léger voile beige clair jusque dans la nuque.
Dos	Jaunes avec un léger voile beige.
Poitrine, flancs, croupion	Jaunes.
Ventre	Blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires beiges avec un liseré jaune. Rémiges secondaires beige clair avec un liseré jaune. Couvertures jaunes.
Queue	Beige avec les deux premiers tiers jaunes.
Yeux	Isabelle.
Pattes, doigts, ongles, bec	Couleur chair.



Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est moins lumineux. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes.

ATTENTION : Risque de confusion avec la variété isabelle satiné

Verdier d'Europe
~ Mutation brun pastel (dénomination provisoire en étude) ~

Taille du corps : 13/15 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun très clair
Région auriculaire, vertex, front, nuque	Brun clair. Masque et sourcils jaune clair chez le mâle
Dos	Jaune clair voilé de brun léger
Gorge, poitrine, flancs	-idem-
Ventre	Beige crème
Ailes	Brun clair avec miroir jaune
Couvertures	Jaune voilé de brun clair
Croupion	Jaune
Queue	Brun clair liseré jaune
Yeux	Brun
Ongles, pattes, doigts, bec	Couleur chair




Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que les mâles mais le pigment est plus foncé. Les liserés jaunes des rémiges et des rectrices sont moins larges et plus ternes.

ATTENTION : Risque de confusion avec la variété isabelle.

Linotte mélodieuse

(*Carduelis cannabina*)

Mâle plumage nuptial



Femelle



Linotte mélodieuse mâle (Carduelis cannabina)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.
YEUX	Brun foncé.
TETE	Front et couronne : brun cannelle avec sourcils crème et une tache crème sur chaque joue.
DOS	Brun marron.
EPAULES	Brun marron.
POITRINE	De couleur beige striée de brun noir.
GORGE et MENTON	Blanchâtre avec stries brun foncé
FLANCS	Brun clair avec des fines stries brun foncé.
VENTRE	Blanchâtre.
AILES	Grandes rémiges primaires noires avec un liseré externe blanc. Rémiges secondaires : brun marron.
CROUPION	Cannelle clair, légèrement strié de raies interrompues.
QUEUE	Rectrices noires avec un liseré blanc le long du vexille externe.
PATTES et DOIGTS	Brunâtre.
ONGLES	Noir.
BEC	Gris-brun clair en hiver avec la mandibule inférieure plus claire.



Linotte mélodieuse femelle (Carduelis cannabina)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 14cm

Mêmes caractéristiques que le mâle mais la poitrine, la tête et les flancs sont plus striés que chez le mâle.



Linotte à bec jaune

(*Carduelis flavirostris*)



Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 14cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Petit, jaune avec pointe noirâtre.
YEUX	Brun foncé.
TETE	Petite et ronde. Front, couronne, joues et nuque : brun ocre, striés de noir. Lorums : de couleur rouille.
DOS	Brun ocre, strié de brun noirâtre.
EPAULES	Jaune ocre.
POITRINE	Brun ocre avec des stries brun foncé, partant du milieu de la poitrine vers les flancs.
GORGE	Brun ocre, légèrement strié.
FLANCS	Brun ocre avec des stries brun foncé et bien régulières.
VENTRE	Blanc sale.
AILES	Brun noirâtre avec un étroit liseré blanc le long du vexille externe des rémiges
CROUION	Rose carmin dans la nature mais ocre roux n'est pas fautif.
QUEUE	Brun noirâtre avec liseré blanchâtre le long du vexille externe, l'extrémité de la queue fourchue.
PATTES et DOIGTS	Brun noirâtre.
ONGLES	Noir.



La femelle ressemble au mâle mais est de couleur plus pâle. Le croupion n'est jamais carmin mais brun gris léger avec des stries noires et étroites.

Genre Pyrrhula


Bouvreuil pivoine

(*Pyrrhula pyrrhula europaea*)

Male



Femelle



Taille 15cm

Bouvreuil pivoine (ponceau)

(pyrrhula pyrrhula pyrrhula)



Taille 18 cm,

- moins coloré qu'europaea
- Sans trace de rouge sur le dos

Bouvreuil pivoine (ibère)

(*pyrrhula pyrrhula iberiae*)



Taille 13,5 cm,

- plus coloré que les deux autres sous-espèces
- peut présenter des traces rouges sur le manteau

Bouvreuil pivoine (ibère)

(pyrrhula pyrrhula iberiae)



Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) ~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte et contours du bec noirs. Nuque courte et bien remplie.
Dos, épaules	Gris bleuâtre. Sans trace de rouge, sauf <i>ssp iberiae</i>
Gorge, poitrine, flancs	Couleur rouge régulièrement répartie et délimitée par la calotte noire en-dessous des yeux.
Abdomen, sous-caudales	Blancs.
Rémiges	Rémiges primaires et secondaires noires à reflets bleuâtres. Bande alaire gris blanc qui part du bord externe de l'aile et s'élargit vers le dos. Deux petites plumules rouges garnissent l'extrémité des rémiges tertiaires.
Croupion	Blanc.
Queue	Noir brillant.
Yeux	Noirs.
Bec	Noir, court et très bombé avec extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.
Pattes, doigts, ongles	Noirs.



Photo Philippe ROCHER




Photo Philippe ROCHER

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs plus ternes.

De plus, chez la femelle, le dos est gris brunâtre et la poitrine est gris brunâtre teinté de beige.

Bouvreuil pivoine
~ *Mutation pastel* ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte brun noirâtre. Joux de couleur rosée.
Dos, épaules	Gris pastel (gris beige).
Poitrine	Rose.
Abdomen, sous-caudales	Blancs.
Rémiges	Rémiges primaires et secondaires gris foncé. Barre alaire gris beige clair. Taches roses sur des rémiges tertiaires.
Croupion	Blanc.
Queue	Gris foncé avec sus-caudales plus claires.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun noirâtre.
Pattes, doigts	Brun foncé.
Ongles	Foncés.

Dimorphisme sexuel : mêmes caractéristiques que le mâle avec les couleurs du manteau et de la poitrine beige clair.

Photo UOF S. Chartier



Bouvreuil pivoine mâle Mutation brun ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte brun très foncé tirant sur le noir.
Dos	Gris clair avec reflets beiges.
Epaules	Gris clair.
Poitrine, gorge, flancs	Roses.
Ventre	Tirant sur le blanc.
Rémiges	Rémiges primaires brunes. Rémiges secondaires brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris clair.
Couvertures	Brun très foncé tirant sur le noir.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun très foncé avec reflets métalliques.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.
Pattes, doigts	Brun très clair.
Ongles	Bruns.

Remarque : les rectrices ont leur partie externe brun très foncé à reflets métalliques et leur partie interne brune, sauf pour les deux médianes entièrement brun foncé à reflets métalliques. Vue de dessous, la queue apparaît brune.



Photo Philippe ROCHER

Bouvreuil pivoine femelle
~ Mutation brun ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Calotte brun foncé tirant sur le noir. Joues beige brun.
Dos	Beige brun lavé de gris.
Epaules	Beige brun lavé de gris.
Poitrine, gorge, flancs	Beige brun très uniforme.
Ventre	Clair, tirant sur le blanc.
Rémiges	Rémiges primaires brunes. Rémiges secondaires brun très foncé tirant sur le noir. Barre alaire gris beige.
Couvertures	Brun très foncé tirant sur le noir.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun très foncé avec reflets métalliques.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Mandibule supérieure brune. Mandibule inférieure couleur chair.
Pattes, doigts	Brun très clair.
Ongles	Bruns.



Photo Orismans

Bouvreuil pivoine mâle
~ *Mutation brun pastel* ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Front, calotte, nuque, lorums, menton	Brun noisette chaud. léger voile rouge au vertex toléré
Dos	Gris beige très clair.
Poitrine, gorge, flancs	Rouge rose.
Ventre	Région anale blanche.
Rémiges	Rémiges primaires beige clair. Rémiges secondaires et tertiaires brun beige. Bande alaire claire.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun beige.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Bruns.



Bouvreuil pivoine femelle
 ~ *Mutation brun pastel* ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm


Zones du plumage	Couleur
Front, calotte, nuque, lorums, menton	Brun noisette chaud.
Dos	Beige.
Poitrine, gorge, flancs	Beiges, légèrement teintés de lilas.
Ventre	Région anale blanche.
Rémiges	Rémiges primaires beige clair. Rémiges secondaires et tertiaires brun beige. Bande alaire claire.
Croupion	Blanc.
Queue	Brun beige.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Bruns.



Bouvreuil pivoine
~ Mutation blanc ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur	
Tête	blanche	Photo RBOF
Dos, épaules	blanc.	
Gorge, poitrine, flancs	Chez le mâle rose saumon clair Chez la femelle blanche.	
Abdomen, sous-caudales	Blancs.	
Ailes	rémiges blanches deux couvertures rose saumon	
Croupion	Blanc.	
Queue	blanche.	
Yeux	Noirs.	
Bec	Couleur chair	
Ventre	blanc	
Pattes, doigts,	Couleur chair	
ongles	blancs.	



DEFAUTS ; traces de couleur sur le dos

Bouvreuil pivoine ~ Mutation jaune ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zones du plumage	Couleur
Calotte et tour du bec	Noirs jusqu'en dessous des yeux.
Dos, épaules	Gris bleuâtre.
Poitrine, gorge, flancs	Couleur jaune verdâtre régulièrement répartie.
Bas de l'abdomen, sous-caudales, croupion	Blancs.
Ailes	Rémiges primaires et secondaires noires à reflets bleuâtres. Bande alaire gris blanc à partir du bord externe de l'aile en s'élargissant vers le dos. Deux plumules rouges à l'extrémité des rémiges tertiaires.
Queue	Rectrices noir brillant.
Yeux	Noirs.
Bec	Noir, court et très bombé avec l'extrémité de la mandibule supérieure légèrement courbée.
Ongles, pattes, doigts	Noirs.




Photo Driemans

Dimorphisme sexuel : la femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle mais les couleurs sont plus ternes.

Remarque : cette mutation a été combinée aux autres variétés existantes.

Bouvreuil pivoine
~ *Mutation brun pastel jaune* ~

Même caractéristique que le
Brun pastel mais
Avec la face ventrale jaune



Photo Orizsmans

Bouvreuil pivoine mâle
~ Mutation topaze ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

zone du plumage	Couleur
bec	Couleur corne, court et massif
yeux	Rouge foncé.
tête	Calotte : gris foncé avec un minimum de rouge dans la calotte. Joues : orange rouge
dos	Gris bleu clair sans voile rouge
poitrine, flancs, gorge	Orange rouge.
ventre	Orange rouge, blanc dans la partie inférieure
ailes	Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire
queue et croupion	Gris foncé en harmonie avec les rémiges Croupion blanc
pattes & doigts	Couleur chair
ongles	corne



Photo RBOF

Les variétés pastel topaze et brun topaze sont en étude

Bouvreuil pivoine femelle
~ Mutation topaze ~

Taille du corps : 13,5 - 18 cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Couleur corne, court et massif
YEUX	Rouge foncé.
TETE	Calotte : gris foncé. Joues : gris brun clair
DOS	Gris-brun foncé sans voile rouge.
POITRINE	Gris brun clair.
FLANCS	De même couleur que la poitrine
VENTRE	Gris brun clair, blanc dans la partie inférieure
AILES	Gris foncé, bien réparti avec une barre alaire plus claire partant du bord de l'aile. Flamme sur la dernière rémige tertiaire
QUEUE & CROUPION	Gris en harmonie avec les rémiges Croupion blanc
PATTES & DOIGTS	Couleur chair
ONGLES	corne



Photo RBOF

Genre *fringilla*

Pinson des arbres

(*Fringilla coelebs*)

Mâle



Pinson des arbres mâle (Fringilla coelebs)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Noir.
Couronne, occiput, nuque	Gris bleuté.
Joues, lorums, menton, sourcils, région auriculaires, gorge, poitrine, flancs	Passant du rose brun ou rouge brun.
Dos	Brun marron.
Epaules	Gris bleuté.
Ventre	Région anale blanche.
Rémiges	Primaires brun noir. Secondaires brun noir avec un liseré jaunâtre à la partie inférieure des rémiges. Sus-alaires et barre alaire blanches avec petit miroir blanc.
Croupion	Vert olive teinté de jaune.
Queue	Rectrices brun noirâtre étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Rectrices externes avec grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Bleu acier en été, brun gris avec l'extrémité plus foncée en hiver.
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	Noirâtres.



Photo Philippe ROCHER

Pinson des arbres femelle (Fringilla coelebs)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, dos, poitrine	Gris brun.
Gorge	Gris brun sans taches plus claires.
Epaules	Brun beige.
Flancs	Gris brun sans être délavés.
Ventre	Région anale blanc sale.
Rémiges	Comme le mâle mais plus brunes. La barre alaire est aussi moins blanche.
Croupion	Vert lavé de jaunâtre.
Queue	Comme le mâle mais plus brune.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Gris brun.
Pattes, doigts	Brun clair.
Ongles	Noirâtres.



Pinson des arbres mâle
~ *Mutation brun* ~

Taille du corps : 14 cm


Zones du plumage	Couleur
Tête	Brun avec la bande frontale plus foncée.
Gorge, poitrine	Brun avec un voile lie de vin.
Dos	Brun.
Flancs	Brun avec un voile lie de vin.
Ventre	Brun clair.
Rémiges	Rémiges primaires brunes avec un miroir blanc. Rémiges secondaires brunes.
Couvertures	Grandes couvertures brunes avec une barre alaire crème. Couvertures moyennes brunes avec barre scapulaire blanche. Petites couvertures brunes.
Croupion	Brun.
Queue	Brun avec dessin blanc sous la queue.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun clair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Pinson des arbres femelle
~ *Mutation brun* ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, dos, poitrine	Brun chaud.
Gorge	Brun chaud.
Flancs	Brun chaud.
Ventre	Région anale blanc crème.
Rémiges	Rémiges primaires brun chaud avec un miroir blanc. Rémiges secondaires brun chaud.
Couvertures	Grandes couvertures brun chaud avec un miroir blanc. Couvertures moyennes brun chaud avec barre scapulaire blanche. Petites couvertures brun chaud.
Croupion	Brun chaud.
Queue	Brun chaud avec dessin blanc sous la queue.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun clair.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Couleur chair.



Pinson des arbres mâle
~ *Mutation agate* ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Noir.
Couronne, occiput, nuque	Gris bleuté.
Joues, lorums, menton, sourcils, région auriculaires, gorge, poitrine, flancs	Rose brun.
Dos	Gris brunâtre.
Ventre	Région anale blanche.
Ailes	Rémiges primaires noires. Rémiges secondaires noires avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus- alaires (épaules) blanches. Barre alaire blanche et petit miroir blanc.
Croupion	Vert olive teinté de jaune.
Queue	Rectrices noires étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Bleu acier en été, gris avec l'extrémité plus foncée en hiver.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Foncés.



Photo RBOF

Pinson des arbres femelle
~ Mutation agate ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, dos	Gris brun clair, avec deux raies gris foncé sur le vertex et descendant dans la nuque.
Gorge, poitrine	Gris clair.
Dos, épaules	Gris brun clair.
Flancs	Gris brun clair.
Ventre	Région anale gris blanc sale.
Ailes	Rémiges primaires noires. Rémiges secondaires noires avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus- alaires (épaules) blanches. Barre alaire moins blanche que chez le mâle et petit miroir blanc.
Croupion	Vert lavé de jaunâtre.
Queue	Rectrices noires étroitement liserées de vert le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Brun clair légèrement flammé de gris.
Pattes, doigts	Couleur chair.
Ongles	Foncés.



Pinson des arbres mâle
~ Mutation opale ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Front	Noir.
Couronne, occiput, nuque	Gris foncé bleuté.
Joues, lorums, menton, sourcils, région auriculaires	Couleur jaunâtre, voilée de chamois
Epaules	Gris foncé bleuté.
Gorge, poitrine, flancs	Couleur lie de vin très clair avec un voile gris clair bleuté.
Dos, croupion	Jaune verdâtre. Dos avec des reflets bleutés.
Ventre	Région anale sale blanc.
Ailes	Rémiges primaires gris bleu. Rémiges secondaires gris bleu avec un liseré jaunâtre à leur partie inférieure. Sus-alaires (épaules) blanches. Barre alaire jaune verdâtre et petit miroir blanc.
Queue	Rectrices gris bleuté étroitement liserées de jaune verdâtre le long du vexille externe. Les rectrices externes portent une grande tache blanche à leur partie inférieure.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Gris foncé bleuté en été, gris foncé en hiver.
Pattes, doigts	Couleur chair foncé.
Ongles	Foncés.



Photo A. CUPIDO

Pinson des arbres femelle
~ Mutation opale ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête	Gris clair bleuté avec deux raies plus foncées sur le vertex et descendant dans la nuque.
Dos	Jaune verdâtre avec un voile bleuté
Epaules	Gris clair bleuté.
Gorge, poitrine, flancs	Gris clair lavé de jaunâtre.
Ventre	Région anale gris blanc sale.
Ailes	Comme la mâle mais d'un gris bleuté plus clair.
Croupion	Jaune verdâtre.
Queue	Comme la mâle mais d'un gris bleuté plus clair.
Yeux	Brun foncé.
Bec	Couleur chair foncé légèrement flammé de gris.
Pattes, doigts	Couleur chair foncé.
Ongles	Foncés.



Photo UOF p. Malburgt

Pinson des arbres
~ *Mutation brun opale* ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
Tête, Dos, Epaules Gorge, poitrine, flancs Ventre. Ailes, Croupion Queue, Yeux	Le plumage est presque totalement dépourvu de pigmentation en eumélanine. Il subsiste un léger voile de phaeomélanine sur le dos, les rémiges et les rectrices. Le dos et le poitrail et le croupion sont jaune crème chez le mâle, beige très clair chez la femelle Brun
Pattes, doigts	Couleur chair
Ongles	-idem-



Photo UOF P. Malburet

Pinson du Nord

(*Fringilla montifringilla*)

Mâle plumage hivernal



plumage nuptial



Pinson du nord mâle (Fringilla montifringilla)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14 cm

Zones du plumage	Couleur
BEC	Jaunâtre avec pointe noire.
YEUX	Brun foncé.
TETE	Front, vertex, nuque, joues et région auriculaire : d'une couleur noirâtre, liserée de brun-gris. Cette couleur est uniformément répartie. En été, la tête est complètement noire
DOS et CROUPION	dos : noir écaillé de gris- brun (noir en été). Croupion : Blanc
GORGE	Brun noisette.
POITRINE	De couleur brun noisette, sans voile, et uniformément répartie sur l'ensemble de la poitrine. La ligne qui sépare le brun de la poitrine et le blanc du ventre doit être régulière et légèrement arrondie.
FLANCS	La couleur des flancs est d'un brun clair avec de préférence deux rangées de spots noirs, le plus uniformément répartis. La première rangée sera souvent cachée par l'aile. Les spots des mâles sont plus larges et ont tendance à se grouper plus fort que chez la femelle.
VENTRE	Blanc pur.
AILES	Les scapulaires sont d'un brun noisette et sont bordées d'un étroit liseré clair. La barre alaire a la même couleur que la poitrine (brun noisette). Un petit miroir blanc est obligatoire. Les rémiges primaires sont d'un noir brunâtre foncé Les rémiges secondaires sont noir brunâtre avec le vexille externe brun clair..
QUEUE	Les rectrices sont noires. Les deux rectrices externes ont une grande tache blanche longitudinale sur le côté inférieur. Les sus-caudales médianes sont noirâtres avec un liseré brun à l'extrémité. L'extrémité de la queue est fourchue.
PATTES et DOIGTS	Chair foncé
ONGLES	noir



Plumage nuptial



Plumage hivernal

Photos Philippe ROCHER

Pinson du nord femelle (Fringilla montifringilla)
~ Phénotype sauvage ~

<u>Taille du corps :</u>	14cm
Zone du plumage	couleur
TETE	Comme chez le mâle, mais les teintes sont brun gris dans l'ensemble. Les deux raies brunâtres partent du haut de la tête et descendent vers la nuque.
DOS	Dessin écaillé typique de couleur gris brun.
AILES	Comme le mâle, mais d'une couleur plus terne.
FLANCS	Les spots doivent être bien répartis et réguliers sur deux rangées et sur un fond brun clair.
POITRINE	La couleur ne peut pas être délavée, mais d'un brun noisette, qui sera
VENTRE	Blanc grisâtre.
QUEUE	Brun foncé et fourchue.
TETE	Comme chez le mâle, mais les teintes sont brun gris dans l'ensemble. Les deux raies brunâtres partent du haut de la tête et descendent vers la nuque.
DOS	Dessin écaillé typique de couleur gris brun..



Genre *serinus*


Serin cini

(*Serinus serinus*)

Mâle



Femelle



Serin cini mâle (Serinus serinus)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 11cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Petit, court, conique et gris foncé.
YEUX	Brun foncé.
TETE	Jaune vif partant de la base du bec jusqu'aux yeux passant par du gris vert, strié de brun gris sur la nuque et les joues. Certains vieux mâles ont une tache jaune sur les joues
COU	Demi-collier jaunâtre.
DOS	Gris brunâtre strié de noir.
EPAULES	Gris brunâtre.
POITRINE	Jaune vif.
GORGE	Jaune vif.
FLANCS	Passant du jaune clair dans la région des épaules au gris clair près du
VENTRE	Gris clair.
AILES	Brun noir avec un liseré jaune verdâtre au bord extérieur des rémiges.
CROUPION	Jaune vif.
QUEUE	Brun noir
PATTES et DOIGTS	Couleur chair
ONGLES	Brun foncé



Serin cini femelle (Serinus serinus)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 11cm

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais la couleur jaune vif du mâle est plus atténuée chez la femelle

La femelle est plus striée sur la gorge, la poitrine et les flancs que la mâle. Les stries sont plus larges et plus distinctes




Venturon montagnard

(*Serinus cintrinella*)

Mâle



Femelle



Venturon montanard mâle (Serinus cintrinella)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 12cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Pointu, fin, gris-noirâtre.
YEUX	Brun-noir.
TETE	Fine, dessus et côtés de la tête, nuque et côtés du cou gris-bleuté uni. Masque circulaire : jaune-vert lumineux couvrant le front, la région oculaire, le bas des joues et le menton
DOS	Vert-olive, marqué de stries gris-brun légères et assez floues.
GORGE – POITRINE	Jaune-vert, lumineux comme le masque.
FLANCS	Verts, lavés de gris.
VENTRE	Zone anale et sous-caudales : jaunes.
AILES	Rémiges : noir-verdâtre avec liseré externe gris-vert. Couvertures : noirâtres avec large liseré verdâtre, dessinant une double barre alaire.
CROUPION	Jaune-vert uni.
QUEUE	Rectrices : noir-verdâtre, liserées de gris-vert.
PATTES et DOIGTS	Gris-brun.
ONGLES	Brun-noir.
FORME GENERALE	Fine et élégante.



Venturon montagnard femelle (Serinus cintrinella)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 12cm

La femelle a la même livrée que le mâle avec des teintes un peu plus ternes, un masque moins étendu et des stries un peu plus marquées.

Le gris-bleuté n'est pas interrompu à la gorge



Venturon montagnard corse (Serinus cintrinella corsica)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 12cm

Chez l'espèce *Serinus cintrinella corsicana* :

- le manteau est brun-chaud et la poitrine vert-jaune plus vif.
- La femelle est plus terne



Genre *loxia*

Remarque :

- *En première année la couleur des jeunes mâles peut être moins intensive*


Bec croisé des sapins

(*Loxia curvirostra*)

Mâle



Femelle



Bec croisé des sapins mâle (Loxia curvirostra)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 16.5cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Brun gris foncé et croisé complètement. Racine de la mandibule inférieure plus claire. Les mandibules peuvent croisées d'un côté ou l'autre du bec.
YEUX	Brun foncé.
TETE	Front, vertex et nuque : sont rouge plus ou moins intensif. Certains bec-croisé possèdent un dessin écaillé sur le vertex alors que d'autres ont le vertex de couleur uniforme (les deux sont valables). Dessin en forme de fer à cheval brunâtre sur les joues. Lorums et régions auriculaires : brun foncé nuancé de rose. Bas de la nuque moins rouge et plutôt brunâtre.
DOS	Manteau et scapulaires : moins rouge que la poitrine mais plutôt rouge brunâtre.
POITRINE	Brun rougeâtre.
FLANCS	Brun rougeâtre.
VENTRE	Blanc grisâtre ainsi que la région anale.
AILLES	Rémiges primaires : de couleur noir brunâtre avec un étroit liseré rouge brunâtre le long du vexille externe. Le bout des rémiges possède un bord grisâtre. Couvertures sus alaires de couleur brun foncé. Les petites et les moyennes couvertures sus alaires ont un bord rougeâtre.
QUEUE	Rectrices : de couleur noir brunâtre avec un étroit liseré rougeâtre ou Sous-caudale : grisâtre avec un dessin écaillé (forme de V).
PATTES et DOIGTS	brun foncé.
ONGLES	Noir.



Bec croisé des sapins femelle (Loxia curvirostra)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 16.5cm

La femelle possède les mêmes marques que le mâle, mais la couleur de presque toutes les parties du corps est vert olive grisâtre.

La femelle est plus striée de brun dans l'ensemble que le mâle, notamment sur la tête, la poitrine, le dos et les flancs. Le croupion est jaune verdâtre.

La femelle possède un dessin frontal typiquement gris clair.



Photo P. Malburet

Bec croisé bifascié

(Loxia leucoptera bifasciata)



Bec croisé bifascié mâle (Loxia leucoptera)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 14.5cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Couleur corne, assez long. Les mandibules se croisent à l'extrémité de façon très distincte
YEUX	Noir.
TETE	Entièrement rouge carmin, légèrement écaillée avec la zone loreale et le dessin des joues gris. Le sommet du crâne et la nuque portent une légère suffusion grise
DOS	Rouge carmin, voilé de gris et faiblement écaillé.
GORGE et POITRINE	Rouge carmin.
FLANCS	Rouge carmin indistinctement lavé de gris.
VENTRE	Rouge carmin, se dégradant en blanc sale sur la zone anale.
AILES	Rémiges : noires, liserées de blanc. Les rémiges secondaires externes sont plus largement liserées, surtout à leur extrémité. Couvertures : noires avec une nette bordure blanche, qui dessine une qui dessine une double barre alaire très nette.
CROUPION	Rouge carmin, légèrement écaillé sur son pourtour.
SOUS-CAUDALE	Porte un dessin écaillé typique, qui doit être régulier.
QUEUE	Assez courte, légèrement échancrée. Rectrices : noires, très finement liserées de grisâtre
PATTES	Gris brun. Robustes et assez courtes.
DOIGTS	Gris brun.
ONGLES	Couleur corne.



Photo Philippe ROCHER

Bec croisé bifascié femelle (Loxia leucoptera)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 14.5cm

La femelle possède les mêmes marques que le mâle, mais la couleur de presque toutes les parties du corps est vert olive grisâtre.

La femelle est plus striée de brun dans l'ensemble que le mâle, notamment sur la tête, la poitrine, le dos et les flancs. Le croupion est jaune verdâtre.

La femelle possède un dessin frontal typiquement gris clair.



Bec croisé perroquet

(*Loxia pytyopsittacus*)

Mâle



Loxia scotica
Mâle



Bec croisé perroquet mâle (Loxia pytyopsittacus)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 17cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Couleur corne, puissant, de forme assez lourde. Les extrémités des mandibules se croisent de façon plus courte que chez le bec croisé des sapins
YEUX	Noir.
TETE	Large, puissamment enchâssée dans les épaules. Front et vertex : de rouge carmin à rouge brique. Lorums et nuque : voilés de brun. Dessin des joues : brun.
DOS	Rouge, fortement mêlé de brun et portant un léger dessin écaillé.
GORGE	Rouge carmin à rouge brique uni.
POITRINE	Rouge plus ou moins voilé de brun.
FLANCS	Rouge brunâtre.
VENTRE	Blanc grisâtre, légèrement strié sur les côtés.
AILES	Rémiges : brun noirâtre, portant un étroit liseré plus clair. Grandes couvertures : bordées de brun rougeâtre.
CROUPION	Rouge carmin à rouge brique.
SOUS-CAUDALE	Porte un dessin écaillé typique qui doit être régulier.
QUEUE	Courte, échancrée. Rectrices : brun noirâtre, étroitement bordées de brun.
PATTES	Couleur corne, courtes et robustes.
DOIGTS	Couleur corne.
ONGLES	Brun noir.




Photo Philippe ROCHER

Bec croisé perroquet femelle (Loxia pytyopsittacus)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 17 cm

La femelle présente le même dessin que le mâle.
Le rouge est remplacé par une teinte brun olive plus
lumineuse à la poitrine et au croupion.
Les stries sont plus marquées.



Photo Philippe ROCHER

Genre *pinicola*


Durbec des sapins

(*Pinicola enucleator*)

Mâle adulte



Femelle





Mâle 1^{ère} année



Photo KBOF

Durbec des sapins mâle (Pinicola enucleator)
~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 20cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Gris noir, puissant. Mandibule supérieure bombée. L'extrémité courbée vers le bas en forme de croc
YEUX	Noir.
TETE	Assez étroite et plate, rose carmin, reflets gris noirâtre sur la zone loreale et oculaire.
COU	Encolure large et puissante, nuque peu marquée, rose carmin.
DOS	Large, rose carmin, marqué d'un écaillage gris noirâtre très régulier.
GORGE et POITRINE	Entièrement rose carmin.
FLANCS	Etroite bande gris léger soulignant l'aile.
VENTRE	Le rose de la poitrine se dégrade en gris blanchâtre, plus clair sur la zone anale.
AILES	Rémiges primaires : noirâtres, portant un fin liseré gris sur le vexille Rémiges secondaires : noirâtres, largement liserées de blanc, surtout vers l'extrémité Couvertures : noires avec bordure blanche, formant une double barre alaire très distincte.
CROUPION	Rose carmin.
QUEUE	Assez longue et échancrée. Rectrices : noirâtres, portant un très faible liseré gris brun.
PATTES et DOIGTS	Gris-noir.
ONGLES	Gris-noir.

La couleur rose-carmin ne s'exprime qu'à partir de la 2^{ème} année. En première année la couleur est orange plus ou moins intense

Photo mâle adulte



Photo Philippe **ROCHER**

Durbec des sapins femelle (Pinicola enucleator)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 20cm

Les teintes sont plus ternes et le rose carmin est remplacé par un ton gris jaunâtre selon les individus. Le croupion est gris.




Genre *coccothraustes*


Gros bec casse-noyaux

(*Coccothraustes coccothraustes*)

Mâle



Mâle plumage nuptial



Gros bec casse-noyaux mâle (Coccothraustes coccothraustes) ~ Phénotype sauvage ~

Taille du corps : 18cm



Photo Philippe ROCHER

Zone du plumage	Couleur
BEC	En hiver : de couleur corne pâle. En été : de couleur bleu acier
YEUX	Gris brunâtre. Cercles oculaires : brun rougeâtre.
TÊTE	Le dessus de la tête est brun. Clair sur le front et foncé sur l'occiput Le liseré frontal, les lorums, le menton et le tour du bec sont noirs La région auriculaire et les joues sont de couleur brun jaunâtre. Le bas des joues et les parties inférieures du cou sont de couleur gris clair.
DOS	Le dos, le manteau et les scapulaires sont de couleur brun foncé. Le bas du dos est brun grisâtre. Le croupion et les sus caudaux sont de couleur brun jaunâtre.
GORGE	Menton et gorge : noir avec un léger liseré très pâle autour de la bavette (le minimum sera le meilleur).
POITRINE	Gris brunâtre, pâle lavé de rose.
FLANCS	Brun grisâtre, plus foncés que la poitrine.
VENTRE	Gris blanchâtre avec le sous caudale blanc.
AILES	Les rémiges primaires et secondaires externes sont en forme de faucille. Les grandes couvertures alaires sont blanches et forment une barre alaire. Les rémiges secondaires internes sont métalliques. L'extrémité des rémiges secondaires externes sont en forme de faucille.
QUEUE	Courte. Les rectrices médianes sont rousses et les rectrices externes sont noires avec une extrémité blanche. Ceci forme une bande blanche à l'extrémité de la queue.
PATTES et DOIGTS	De couleur brun chair.
ONGLES	Brun foncé.

Plumage nuptial



E. Gómez

Gros bec casse-noyaux femelle (Coccothraustes coccothraustes)
~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 18cm

La femelle a les mêmes caractéristiques que le mâle, mais les teintes sont plus pâles et plus grises.

L'extrémité de la queue de la femelle est moins blanche que chez du mâle.



Photo UOF P. Malburet

Genre *rhodopechys*

Roselin githagine

(*Rhodopechys githaginea*)

Mâle plumage nuptial



Femelle



Roselin githagine (Rhodopechys githaginea)
 ~ *Phénotype sauvage* ~

Taille du corps : 12,5cm

Zone du plumage	Couleur
BEC	Orangé, court, puissant, assez large à la base.
YEUX	Noir.
TETE	Assez étroite, faiblement arrondie, de forme élégante. Cou : assez long. Nuque : marquée
DOS	Gris-brunâtre. Mâle plumage hivernal
POITRINE	Gris, avec léger reflet rose lie de vin.
FLANCS	Du même gris que la poitrine.
VENTRE	Comme la poitrine, sauf la zone anale est gris clair.
AILES	Longues et fines. Rémiges primaires : gris foncé Rémiges secondaires : gris-brun Couvertures : gris-brun Le vexille externe des rémiges et des couvertures portant un étroit liseré clair
QUEUE	De longueur moyenne, légèrement échancrée. Rectrices : gris foncé, bordées d'un liseré clair
PATTES	Assez longues, fines et de couleur chair.
DOIGTS	Couleur chair.
ONGLES	Gris-beige.
FORME GENERALE	Oiseau de forme élégante et fine.



La femelle est plus terne et le bec est plus clair

« Topographie » d'un oiseau




FORMES ET TAILLES



Sizerin flammé 135 - 140 mm



Sizerin cabaret 125 - 135 mm




bouvreuil
145 - 165 mm



Tarin des aulnes
115 - 125 mm



Pinson des arbres
150 mm
Pinson du Nord
160 mm



Verdier 145 - 170 mm

Mutations de la faune européenne homologuées par la COM/OMJ

Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Isabelle	Récessif, lié au sexe
Facteur « dilué & double dilué »	Dominant, autosomal
Ivoire	Récessif, lié au sexe

Sizerin Flammé (*Carduelis flammea*)

Sizerin Blanchâtre (*Carduelis hornemanni*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Pastel (Agate)	Récessif, lié au sexe
Brun pastel (isabelle)	Récessif, lié au sexe
Ecaillé (pastel)	Récessif, lié au sexe
Facteur « foncé »	Dominant, autosomal
Phaéo	Récessif, autosomal

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Isabelle	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Brun	Récessif, lié au sexe
Satiné	Récessif, lié au sexe
Lutino	Récessif, lié au sexe
Facteur « Pastel »	Récessif, lié au sexe

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Facteur « Pastel »	Récessif, lié au sexe
Isabelle	Récessif, lié au sexe
Satiné	Récessif, lié au sexe
Lutino	Récessif, lié au sexe
Blanc masque orange	Récessif, autosomal
Tête blanche	Récessif, autosomal

Jaune
Aminet (eumo)

Dominant, autosomal
Récessif, lié au sexe**

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Opale	Récessif, autosomal

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Facteur « pastel »	Récessif, lié au sexe
Brun	Récessif, lié au sexe
Jaune	Récessif, autosomal
Blanc	Récessif, autosomal
Topaze	Récessif, autosomal

Moineau domestique (*Passer domesticus*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Phaéo (Yeux rouge)	Récessif, autosomal
Agate	Récessif, lié au sexe
Opale	Récessif, autosomal
Facteur « pastel »	Récessif, lié au sexe
Ino	Récessif, lié au sexe
Blanc (Yeux noirs)	Dominant, autosomal
Satiné	Récessif, lié au sexe

Moineau friquet (*Passer montanus*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, autosomal
Facteur « Opale »	Récessif, autosomal

Merle noir (*Turdus merula*)

Phénotype « sauvage »
Pastel
Ino (ex Albino)
Blanc

Dominant
Récessif, lié au sexe
Récessif, lié au sexe
Récessif, autosomal

Brun
Agate
Phaéo
Blanc
Facteur « Pastel »

Récessif, lié au sexe
Récessif, lié au sexe
Récessif, autosomal
Récessif, autosomal
Récessif, lié au sexe

Grive musicienne (Turdus philomelos)

Phénotype « sauvage »
Brun
Blanc
Satiné

Dominant
Récessif, lié au sexe
Récessif, autosomal
Récessif, lié au sexe

Pie bavarde (Pica pica)

Phénotype « sauvage »
Brun

Dominant
Récessif, (lié au sexe)

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

Phénotype « sauvage »

Dominant

Geai des chênes (Garrulus glandarius)

Phénotype « sauvage »
Opale

Dominant
Récessif, autosomal

- Chez la plupart des espèces de la faune européenne, d'autres mutations non reconnues officiellement par la COM/OMJ sont actuellement en étude